

Lac de La Folle

1. Situation :

- Commune : La Ferrière
- AAPPMA : La Ferrière
- Massif : Valloire
- Coordonnées : X : 896 152
Y : 2 038 809




2. Morphologie lacustre :

Profondeur maximale	Surface totale (ha)	Surface littorale (%)	Surface beine (%)
13	1,25	15	49

3. Pôle d'attraction en zone littorale :

BLO	FNM	GAL	GRA	GGR	AFF	EFF	H*
81%	2%	9%	8%	0%	0%	0%	0,67

H : indice de diversité de Shannon



4. Physico-chimie :

Cond (μS/cm)	O2*(mg/L)	O2 %saturation surface	O2 %saturation fond	Tmm* (°C)
10	9,2	104	97	19

*oxygène au fond au point le plus profond
*température moyenne maximale des 30 jours les plus chauds

5. Gestion piscicole

Caractéristiques :

- ⇒ Profondeur moyenne 13 m,
- ⇒ Bonne oxygénation,
- ⇒ Qualité habitationnelle faible : 4 pôles d'attractions,
- ⇒ Température moyenne maximale (Tmm) chaude,
- ⇒ Type mésologique de 2,5

Alevinage : Aucun

⇒ Peuplement conseillé : **omble chevalier et vairon**

	La Folle
Type de lac	L 2
Tributaire fonctionnel	Non
Peuplement piscicole actuel	OBL VAI
Peuplement piscicole optimal	OBL VAI

Lac Noir

1. Situation :

- Commune : La Ferrière
- AAPPMA : La Ferrière
- Massif : Valloire
- Coordonnées : X : 897 007
Y : 2 039 125




2. Morphologie lacustre :

Profondeur maximale	Surface totale (ha)	Surface littorale (%)	Surface beine (%)
12	2,5	29	52

3. Pôle d'attraction en zone littorale :

BLO	FNM	GAL	GRA	GGR	AFF	EFF	H*
39%	16%	22%	0%	0%	9%	14%	1,49



H : indice de diversité de Shannon

- AFFERENCE
- EFFERENCE
- FOND NU MINERAL
- SEDIMENT FIN MINERAL
- BLOCS AVEC INFRACTUOSITES
- GRAVIERS
- GALLETS
- GALLETS - GRAVIERS
- SABLES

4. Physico-chimie :

Cond (µS/cm)	O2*(mg/L)	O2 %saturation surface	O2 %saturation fond	Tmm* (°C)
10	9,5	105	95	13

*oxygène au fond au point le plus profond
*température moyenne maximale des 30 jours les plus chauds

5. Gestion piscicole

Caractéristiques :

- Profondeur moyenne 12m,
- Bonne oxygénation,
- Bonne qualité habitationnelle : 5 pôles d'attractions,
- Température moyenne maximale (Tmm) froide : 13°C,
- Marnage supérieur à 1 m
- type mésologique de 1,1

Alevinage : aucun

⇒ Peuplement conseillé : omble chevalier ou cristivomer

	Le Noir
Type de lac	L 1
Tributaire fonctionnel	Non
Peuplement piscicole actuel	OBL
Peuplement piscicole optimal	OBL ou CRI

Lac Layta

1. Situation :

- Commune : La Ferrière
- AAPPMA : La Ferrière
- Massif : Valloire
- Coordonnées : X : 897 007
Y : 2 039 125




2. Morphologie lacustre :

Profondeur maximale	Surface totale (ha)	Surface littorale (%)	Surface beïne (%)
3	0,85	34	66

3. Pôle d'attraction en zone littorale :

BLO	FNM	GAL	GRA	GGR	AFF	EFF	H*
21%	55%	0%	8%	0%	11%	5%	1,25

H : indice de diversité de Shannon



4. Physico-chimie :

Cond (μS/cm)	O2*(mg/L)	O2 %saturation surface	O2 %saturation fond	Tmm* (°C)
48	9,5	107	97	8,4

*oxygène au fond au point le plus profond
*température moyenne maximale des 30 jours les plus chauds

5. Gestion piscicole

Caractéristiques :

- ↳ Profondeur très faible 3m,
- ↳ Bonne qualité habitationnelle : 5 pôles d'attractions, ,
- ↳ Température moyenne maximale (Tmm) très froide,
- ↳ Type mésologique de 1,1

Alevinage : aucun

⇒ Gestion conseillée : **vieille écologique sans poissons**

	Layta
Type de lac	L 1
Tributaire fonctionnel	Oui
Peuplement piscicole actuel	/
Peuplement piscicole optimal	/