

Atlas des stations de suivi

L'Aroy à Monsols.....	3
L'Artilla à Thurin	6
L'Aze à Claivesolles.....	9
Le Badier à Letra	12
Le Berthier à Cours-La-Ville.....	15
Le Bozançon à la Ponçonnière	18
Le Breuil à Le curet.....	21
Le Cartelier à Thurins	24
Le Colombier à Monsols.....	27
Le Conan à Bessenay	30
Le Cosne à Brullioles	33
La Darde-Coise à Larajasse.....	36
L'Ergues à Poule les Echarmeaux	39
Le Frelon à Saint Bonnet le Troncy	42
La Grande Rivière à La Tour de Salvagny	45
L'Inverse à St Symphorien d'Ozon	48
Le Marverand à Saint Julien	51
La Mauvaise à Vauxrenard	54
Le Mézerin à Echalas.....	57
Le Morgon à Cogny	60
Le Nizerand à Denicé	63
L'Orjolle à Aveize.....	66
Le Pelot à Saint Christophe	69
Le Potensinet à Larajasse	72
Le Rochefort à Saint Vincent de Reins	75
Le Ronçon à Saint Bonnet le Troncy	78
Le Rossand à Montromant.....	81
Le Rosson à Larajasse.....	84
Le Ry à Grandis.....	87
Le Soanan à Valsonne	90
Le Sornin à Aigueperse.....	93
Le Sornin à St Igny de Vers.....	96
Le Sornin à Propières	99
Le Saint Didier à la Vouzelle.....	102
Le Thel à Ouroux	105
Le Torranchin à Villecheneve	108
La Trambouze à La Ville	111
La Turdine à Joux	114
L'Yzeron aux Adrets	117
L'Yzeron à Brindas.....	120

Espèce	Nom commun	Code
<i>Alburnus alburnus</i>	ablette	ABL
<i>Anguilla anguilla</i>	anguille	ANG
<i>Barbus barbus</i>	barbeau	BAF
<i>Barbus meridionalis</i>	barbeau méridional	BAM
<i>Blicca bjoerkna et Abramis brama</i>	brèmes	BBB
<i>Leuciscus souffia</i>	blageon	BLN
<i>Rhodeus amarus</i>	bouvière	BOU
<i>Esox lucius</i>	brochet	BRO
<i>Carassius sp.</i>	carassins	CAS
<i>Cyprinus carpio</i>	carpe	CCO
<i>Cottus gobio</i>	chabot	CHA
<i>Leuciscus cephalus</i>	chevaine	CHE
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	épineche	EPI
<i>Pungitius pungitius</i>	épinochette	EPT
<i>Rutilus rutilus</i>	gardon	GAR
<i>Gobio gobio</i>	goujon	GOU
<i>Gymnocephalus cernuus</i>	gremille	GRE
<i>Chondrostoma nasus</i>	hotu	HOT
<i>Barbatula barbatula</i>	loche franche	LOF
<i>Lota lota</i>	lote	LOT
<i>Lampetra planeri</i>	lamproie de Planer	LPP
<i>Thymallus thymallus</i>	ombre	OBR
<i>Ictalurus melas</i>	poisson chat	PCH
<i>Perca fluviatilis</i>	perche	PER
<i>Lepomis gibbosus</i>	perche soleil	PES
<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	rotengle	ROT
<i>Stizostedion lucioperca</i>	sandre	SAN
<i>Salmo salar</i>	saumon	SAT
<i>Alburnoides bipunctatus</i>	spiralin	SPI
<i>Tinca tinca</i>	tanche	TAN
<i>Chondrostoma toxostoma</i>	toxostome	TOX
<i>Salmo trutta fario</i>	truite	TRF
<i>Phoxinus phoxinus</i>	vairon	VAI
<i>Leuciscus leuciscus</i>	vandoise	VAN

L'Aroy à Monsols

Code station	AROY-01	Commune	Monsols
Cours d'eau	Aroy	Localisation	Les Charbonniers, amont pont,
Coordonnées Lambert II de la limite aval	767 783	Objet de la pêche	Sondage
	2 137 488	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	08/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Etiage	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2




Caractéristiques de la station

Altitude (m)	554
Distance à la source (km)	2,2
Bassin versant drainé (km²)	2,9
Pente moyenne (‰)	59,5
Longueur (m)	130
Largeur en eau (m)	2,1
Surface de la station (m²)	273
Conductivité (µS/cm)	51




Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	95
Epaisseur de la ripisylve	Forêt (>10m) - 2 rives
Ombrage (% de surface)	90
Abris (% de surface)	3,2



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du	01/06/2014	au	15/09/2014
T max jour (°C)		15,2	le	12/06/2014
T max abs (°C)		17,1	à	16:00:00
T max 30 (°C)				15,4
sur la période	du	07/06/2014	au	06/07/2014
T moy 30 (°C)				13,9
sur la période	du	07/06/2014	au	06/07/2014
Nombre d'heures >25°C				2
Amoy30 - Tmax30 (°C)				4,3




Code station : AROY-01	Cours d'eau : Aroy	Localisation : Les Charbonniers, amont pont, depuis grosse sous berge RG	Date : 08/06/2015
------------------------	--------------------	--	-------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	CHA	TRF _a	TRF _i														Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	99	65	47														211
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																	
Densités estimées (ind/1000m ²)	664	298	287														1189
Effectif capturé/estimé (%)	66	66	66														65
Biomasses capturées au 1er passage (g)	444	1482	36														1962
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																	
Biomasses estimées (kg/ha)	27	68	2,2														97
Biomasse capturée/estimée (%)	66	66	66														74

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche



Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Peuplement théorique type B 2 (estimé)

Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
(prenant en compte les données de densité et de biomasse)


Note Indice Poissons Rivière (IPR) 5,1

<= 7	[7-16]	[16-25]	[25-36]	> 36
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise

Scores des métriques de l'IPR


Nombre total d'espèces (NTE)	0,22
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)	0,51
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)	0,67
Densité totale d'individus (DTI)	1,26
Densité d'individus tolérants (DIT)	0,68
Densité d'individus invertivores (DII)	0,32
Densité d'individus omnivores (DIO)	1,42

Historique des notes IPR





Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	5846	70
Très importante	> 10000	> 300
Importante	[5500;10000]	[200;300]
Assez importante	[3200;5500]	[125;200]
Moyenne	[1800;3200]	[75;125]
Assez faible	[1100;1800]	[50;75]
Faible	[600;1100]	[30;50]
Très faible	< 600	< 30



Suivi piscicole des têtes de bassin versant du département du Rhône 2015 - Atlas



L'Artilla à Thurins

Code station	ARTIL-01	Commune	Thurins
Cours d'eau	Artilla	Localisation	Le Viollet, jusqu'à la grosse touffe
Coordonnées Lambert II de la limite aval	778 664	Objet de la pêche	Sondage
	2 077 515	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	02/07/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2




Caractéristiques de la station

Altitude (m)	355
Distance à la source (km)	6,4
Bassin versant drainé (km²)	14,2
Pente moyenne (‰)	22
Longueur (m)	90
Largeur en eau (m)	2,7
Surface de la station (m²)	239
Conductivité (µS/cm)	236




Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	100
Epaisseur de la ripisylve	rive droite / Cordon (
Ombrage (% de surface)	90
Abris (% de surface)	4,8



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du	au
T max jour (°C)		le
T max abs (°C)		à
T max 30 (°C)		
sur la période	du	au
T moy 30 (°C)		
sur la période	du	au
Nombre d'heures >25°C		
Amoy30 - Tmax30 (°C)		




Code station : ARTIL-01	Cours d'eau : Artilla	Localisation : Le Viollet, jusqu'à la grosse touffe d'aulnes RG (aval du	Date : 02/07/2015
-------------------------	-----------------------	--	-------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	LOF	VAI	TRFa	TRFj													Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	45	14	15	16													90
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																	
Densités estimées (ind/1000m³)	313	97	78	111													600
Effectif capturé/estimé (%)	60	60	60	60													60
Biomasses capturées au 1er passage (g)	178	64	1621	15													1878
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																	
Biomasses estimées (kg/ha)	12	4,5	85	1,0													103
Biomasse capturée/estimée (%)	60	60	60	60													77

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche




Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Peuplement théorique type B 3 (estimé)


Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
(prenant en compte les données de densité et de biomasse)

Note Indice Poissons Rivière (IPR)					15,0
< 7	17-161	116-251	225-361	> 36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (NTE)					0,93
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					4,14
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					1,72
Densité totale d'individus (DTI)					0,12
Densité d'individus tolérants (DIT)					5,17
Densité d'individus invertivores (DII)					1,63
Densité d'individus omnivores (DIO)					1,25




Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	1897	86
Très importante	> 7000	> 300
Importante	14000;70000	1200;3000
Assez importante	12200;40000	1125;2000
Moyenne	11200;22000	175;125
Assez faible	1700;1200	150;75
Faible	1400;700	130;50
Très faible	< 400	< 30



Suivi piscicole des têtes de bassin versant du département du Rhône 2015 - Atlas



L'Aze à Claivesolles

Code station	AZE-02	Commune	Claivesolles
Cours d'eau	Aze	Localisation	Clavesette, depuis 5m en amont
Coordonnées Lambert II de la limite aval	766 609	Objet de la pêche	Sondage
	2 126 846	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	15/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2




Caractéristiques de la station

Altitude (m)	494
Distance à la source (km)	9,7
Bassin versant drainé (km²)	16
Pente moyenne (‰)	24,4
Longueur (m)	90
Largeur en eau (m)	3,0
Surface de la station (m²)	270
Conductivité (µS/cm)	97




Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	95
Epaisseur de la ripisylve (m) droite / Boisement (S)	
Ombrage (% de surface)	90
Abris (% de surface)	3,6



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du 01/06/2014	au 15/09/2014
T max jour (°C)	17,8	le 12/06/2014
T max abs (°C)	19,7	à 17:00:00
T max 30 (°C)		17,2
sur la période	du 07/06/2014	au 06/07/2014
T moy 30 (°C)		15,8
sur la période	du 07/06/2014	au 06/07/2014
Nombre d'heures >25°C		0
Amoy30 - Tmax30 (°C)		5,1




Code station : AZE-02	Cours d'eau : Aze	Localisation : Clavesette, depuis 5m en amont du pont	Date : 15/06/2015
-----------------------	-------------------	---	-------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	LPP	TRF _a	TRF _j	CHA													Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	7	25	25	72													129
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																	758
Densités estimées (ind/1000m ²)	43	116	154	444													65
Effectif capturé/estimé (%)	60	60	60	60													72
Biomasses capturées au 1er passage (g)	20	1150	62	490													1722
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																	
Biomasses estimées (kg/ha)	1,2	53	3,8	30													89
Biomasse capturée/estimée (%)	60	60	60	60													72

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche




Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Peuplement théorique type B 3 (estimé)

Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
(prenant en compte les données de densité et de biomasse)




Note Indice Poissons Rivière (IPR) 5,4

<= 7	]7-16]	]16-25]	]25-36]	> 36
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise

Scores des métriques de l'IPR

Nombre total d'espèces (NTE)	0,40
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)	1,36
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)	0,37
Densité totale d'individus (DTI)	0,75
Densité d'individus tolérants (DIT)	0,55
Densité d'individus invertivores (DII)	0,42
Densité d'individus omnivores (DIO)	1,56




Historique des notes IPR



Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	2701	57
Très importante	> 7000	> 300
Importante	]4000;7000]	]200;300]
Assez importante	]2200;4000]	]125;200]
Moyenne	]1200;2200]	]75;125]
Assez faible	]700;1200]	]50;75]
Faible	]400;700]	]30;50]
Très faible	< 400	< 30

Suivi piscicole des têtes de bassin versant du département du Rhône 2015 - Atlas



Le Badier à Letra

Code station	BADIE-01	Commune	Letra
Cours d'eau	Badier	Localisation	Le Badier, 10 m amont pont
Coordonnées Lambert II de la limite aval	769 351	Objet de la pêche	Sondage
	2 109 875	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	15/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Etiage	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2


Caractéristiques de la station

Altitude (m)	316
Distance à la source (km)	4,6
Bassin versant drainé (km²)	4,8
Pente moyenne (‰)	41,2
Longueur (m)	75
Largeur en eau (m)	1,5
Surface de la station (m²)	114
Conductivité (µS/cm)	180





Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	80
Epaisseur de la ripisylve	Cordon (1-5m) - 2 rives
Ombrage (% de surface)	90
Abris (% de surface)	4,2




Coller une
photo station



Caractéristiques thermiques



Période de suivi	du	au
T max jour (°C)		le
T max abs (°C)		à
T max 30 (°C)		
sur la période	du	au
T moy 30 (°C)		
sur la période	du	au
Nombre d'heures >25°C		
Amoy30 - Tmax30 (°C)		




Code station : BADIE-01	Cours d'eau : Badier	Localisation : Le Badier, 10 m amont pont	Date : 15/06/2015
-------------------------	----------------------	---	-------------------

Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	TRF _a	TRF _i															Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	28	96															124
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																	
Densités estimées (ind/1000m ³)	307	1404															1711
Effectif capturé/estimé (%)	88	68															68
Biomasses capturées au 1er passage (g)	880	136															1016
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																	
Biomasses estimées (kg/ha)	96	20															116
Biomasse capturée/estimée (%)	88	68															77

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Peuplement théorique type B 2,5 (estimé)

 Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
 (prenant en compte les données de densité et de biomasse)

Note Indice Poissons Rivière (IPR) 17,0


<= 7	]7-16]	]16-25]	]25-36]	> 36
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise

Scores des métriques de l'IPR

Nombre total d'espèces (NTE)	3,86
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)	3,98
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)	4,26
Densité totale d'individus (DTI)	2,24
Densité d'individus tolérants (DIT)	0,82
Densité d'individus invertivores (DII)	0,11
Densité d'individus omnivores (DIO)	1,78

Historique des notes IPR

Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	17105	116
Très importante	> 10000	> 300
Importante	]5500;10000]	]200;300]
Assez importante	]3200;5500]	]125;200]
Moyenne	]1800;3200]	]75;125]
Assez faible	]1100;1800]	]50;75]
Faible	]600;1100]	]30;50]
Très faible	< 600	< 30



Le Berthier à Cours-La-Ville

Code station	BERTH-01	Commune	Cours-La-ville
Cours d'eau	Berthier	Localisation	Aval barrage, depuis méandre en
Coordonnées Lambert II de la limite aval	754 881	Objet de la pêche	Sondage
	2 124 485	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	10/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2




Caractéristiques de la station

Altitude (m)	585
Distance à la source (km)	1,8
Bassin versant drainé (km²)	2,4
Pente moyenne (‰)	53,5
Longueur (m)	80
Largeur en eau (m)	0,9
Surface de la station (m²)	72
Conductivité (µS/cm)	129




Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	3
Epaisseur de la ripisylve	Rangée (1m) - 2 rives
Ombrage (% de surface)	5
Abris (% de surface)	5,3



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du	au
T max jour (°C)		le
T max abs (°C)		à
T max 30 (°C)		
sur la période	du	au
T moy 30 (°C)		
sur la période	du	au
Nombre d'heures >25°C		
Amoy30 - Tmax30 (°C)		




Code station : BERTH-01	Cours d'eau : Berthier	Localisation : Aval barrage, depuis méandre en RG jusqu'à la grosse touffe de	Date : 10/06/2015
-------------------------	------------------------	---	-------------------

Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	TRFa	TRFj																Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	13	46																59
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																		
Densités estimées (ind/1000m ³)	224	1045																1291
Effectif capturé estimé (%)	60	60																60
Biomasses capturées au 1er passage (g)	436	101																537
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																		
Biomasses estimées (kg/ha)	74	23																99
Biomasse capturée estimée (%)	60	60																75

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Peuplement théorique type B 1,5 (estimé)

 Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
 (prenant en compte les données de densité et de biomasse)


Note Indice Poissons Rivière (IPR) 15,1


<= 7	17-161	116-251	251-361	> 361
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise

Scores des métriques de l'IPR	
Nombre total d'espèces (MTE)	3,47
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)	2,71
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)	4,76
Densité totale d'individus (DTI)	0,15
Densité d'individus tolérants (DTT)	0,30
Densité d'individus invertivores (DII)	0,73
Densité d'individus omnivores (DIO)	2,41

Historique des notes IPR

Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	12905	99
Très importante	> 5000	> 300
Importante	2700;5000	200;300
Assez importante	1600;2700	125;200
Moyenne	900;1600	175;125
Assez faible	550;900	50;75
Faible	300;550	30;50
Très faible	< 300	< 30





Le Bozançon à la Ponçonnière

Code station	BOZAN-01	Commune	St-Maurice-Sur-Dargoire
Cours d'eau	Bozançon	Localisation	La Ponçonnière, aval chute
Coordonnées Lambert II de la limite aval	778 542	Objet de la pêche	Sondage
	2 065 911	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	02/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2




Caractéristiques de la station

Altitude (m)	309
Distance à la source (km)	6
Bassin versant drainé (km²)	21,3
Pente moyenne (‰)	18,7
Longueur (m)	115
Largeur en eau (m)	2,5
Surface de la station (m²)	290
Conductivité (µS/cm)	373




Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	100
Epaisseur de la ripisylve	rive droite / Cordon (
Ombrage (% de surface)	95
Abris (% de surface)	2,0



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du 01/06/2014	au 15/09/2014
T max jour (°C)	15,1	le 09/10/2014
T max abs (°C)	15,6	à 17:00:00
T max 30 (°C)		13,0
sur la période	du 06/10/2014	au 04/11/2014
T moy 30 (°C)		12,2
sur la période	du 14/06/2014	au 04/11/2014
Nombre d'heures >25°C		0
Amoy30 - Tmax30 (°C)		3,5




Code station : BOZAN-01	Cours d'eau : Bozançon	Localisation : La Ponçonnière, aval chute	Date : 02/06/2015
--------------------------------	------------------------	---	-------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	LOF	TRFa	TRFj															Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	2	186	23															211
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																		
Densités estimées (ind/1000m³)	12	102	132															946
Effectif capturé estimé (%)	60	60	60															77
Biomasses capturées au 1er passage (g)	12	6153	30															6195
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																		
Biomasses estimées (kg/ha)	0,7	265	1,7															268
Biomasse capturée estimée (%)	60	60	60															60

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche



Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Peuplement théorique type B 3 (estimé)


Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
(prenant en compte les données de densité et de biomasse)

Note Indice Poissons Rivière (IPR) 16,3

<= 7	]7-16]	]16-25]	]25-36]	> 36
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise


Scores des métriques de l'IPR	
Nombre total d'espèces (NTE)	3,80
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)	4,68
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)	5,10
Densité totale d'individus (DTI)	1,14
Densité d'individus tolérants (DIT)	0,60
Densité d'individus invertivores (DII)	0,15
Densité d'individus omnivores (DIO)	0,79

Historique des notes IPR




Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	9346	267
Très importante	> 7000	> 300
Importante	]4000;7000]	]200;300]
Assez importante	]2200;4000]	]125;200]
Moyenne	]1200;2200]	]75;125]
Assez faible	]700;1200]	]50;75]
Faible	]400;700]	]30;50]
Très faible	< 400	< 30



Suivi piscicole des têtes de bassin versant du département du Rhône 2015 - Atlas



Le Breuil à Le curet

Code station	BREUI-01	Commune	Le Breuil
Cours d'eau	Ru du Breuil	Localisation	Le Curet, aval pont
Coordonnées Lambert II de la limite aval	773 856	Objet de la pêche	Sondage
	2 101 558	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	12/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Etiage	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2




Caractéristiques de la station

Altitude (m)	264
Distance à la source (km)	2,9
Bassin versant drainé (km²)	4,2
Pente moyenne (‰)	20,1
Longueur (m)	75
Largeur en eau (m)	1,3
Surface de la station (m²)	100
Conductivité (µS/cm)	377



Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	100
Epaisseur de la ripisylve	ive droite / Rangée (1
Ombrage (% de surface)	95
Abris (% de surface)	2,5



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du	au	
T max jour (°C)			le
T max abs (°C)			à
T max 30 (°C)			
sur la période	du	au	
T moy 30 (°C)			
sur la période	du	au	
Nombre d'heures >25°C			
Amoy30 - Tmax30 (°C)			



Fréquences des classes de températures moyennes journalières sur les 30 jours consécutifs les plus chauds

SONDE HS

Code station : BREUI-01	Cours d'eau : Ru du Breuil	Localisation : Le Curet, aval pont	Date : 12/06/2015
-------------------------	----------------------------	------------------------------------	-------------------

Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche


	TRF _a	TRF _i														Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	22	22														44
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																
Densités estimées (ind/1000m ³)	276	348														643
Effectif capturé/estimé (%)	80	60														69
Biomasses capturées au 1er passage (g)	603	33														636
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																
Biomasses estimées (kg/ha)	76	5,5														81
Biomasse capturée/estimée (%)	80	60														79

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Peuplement théorique type B 2 (estimé)


 Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
 (prenant en compte les données de densité et de biomasse)

Note Indice Poissons Rivière (IPR)					16,0
< 7	17-16	16-25	25-36	> 36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (NTE)					4,71
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					4,06
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					4,56
Densité totale d'individus (DTI)					0,19
Densité d'individus tolérants (DIT)					0,59
Densité d'individus invertivores (DII)					0,55
Densité d'individus omnivores (DIO)					1,32


Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	6433	81
Très importante	> 10000	> 300
Importante	15500;100000	1200;3000
Assez importante	13200;55000	1125;2000
Moyenne	11800;32000	175;1251
Assez faible	1100;18000	150;75
Faible	1600;1100	130;50
Très faible	< 600	< 30





Le Cartelier à Thurins

Code station	CARTE-01	Commune	Thurins
Cours d'eau	Cartelier	Localisation	La Fabrique, depuis début
Coordonnées Lambert II de la limite aval	780 128	Objet de la pêche	Sondage
	2 077 875	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	02/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2

Caractéristiques de la station


Altitude (m)	327	
Distance à la source (km)	6,5	
Bassin versant drainé (km²)	13,6	
Pente moyenne (‰)	25,6	
Longueur (m)	80	
Largeur en eau (m)	2,1	
Surface de la station (m²)	170	
Conductivité (µS/cm)	274	

Caractéristiques d'habitat


Ripisylve (% de linéaire)	100
Epaisseur de la ripisylve	rive droite / Cordon
Ombrage (% de surface)	95
Abris (% de surface)	1,7




Profondeur de la lame d'eau (m)



Substrats



Faciès d'écoulement



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du	au	%
T max jour (°C)		le	
T max abs (°C)		à	
T max 30 (°C)			
sur la période	du	au	
T moy 30 (°C)			
sur la période	du	au	
Nombre d'heures >25°C			
Amoy30 - Tmax30 (°C)			


SONDE HS

Code station : CARTE-01	Cours d'eau : Cartelier	Localisation : La Fabrique, depuis début tressage triple RD jusqu'au gros	Date : 02/06/2015
-------------------------	-------------------------	---	-------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	LOF	PFL	TRF _a	TRF _i													Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	48	5	14	66													133
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																	
Densités estimées (ind/1000m ³)	472		103	649													1223
Effectif capturé/estimé (%)	66		66	66													66
Biomasses capturées au 1er passage (g)	227	105	657	94													1083
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																	
Biomasses estimées (kg/ha)	22		48	9,2													80
Biomasse capturée/estimée (%)	66		66	66													66


Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche



Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Peuplement théorique type B 3 (estimé)

 Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
 (prenant en compte les données de densité et de biomasse)



Note Indice Poissons Rivière (IPR) 21,1

<= 7	[7-16]	[16-25]	[25-36]	> 36
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise

Scores des métriques de l'IPR


Nombre total d'espèces (NTE)	3,73
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)	4,70
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)	5,15
Densité totale d'individus (DTI)	1,11
Densité d'individus tolérants (DIT)	4,73
Densité d'individus invertivores (DII)	0,37
Densité d'individus omnivores (DIO)	1,22

Historique des notes IPR



Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	7518	58
Très importante	> 7000	> 300
Importante	[4000;7000]	[200;300]
Assez importante	[2200;4000]	[125;200]
Moyenne	[1200;2200]	[75;125]
Assez faible	[700;1200]	[50;75]
Faible	[400;700]	[30;50]
Très faible	< 400	< 30



Le Colombier à Monsols




Code station	COLOM-02	Commune	Monsols
Cours d'eau	Colombier	Localisation	Le Colombier, depuis la cloture
Coordonnées Lambert II de la limite aval	768 945	Objet de la pêche	Sondage
	2 138 072	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	08/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Faible	Nombre d'épuisette(s)	2

Caractéristiques de la station

Altitude (m)	490	
Distance à la source (km)	1,9	
Bassin versant drainé (km²)	3,4	
Pente moyenne (‰)	31,4	
Longueur (m)	85	
Largeur en eau (m)	1,2	
Surface de la station (m²)	102	
Conductivité (µS/cm)	122	


Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	2
Epaisseur de la ripisylve	
Ombrage (% de surface)	7
Abris (% de surface)	2,5



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du	au
T max jour (°C)		le
T max abs (°C)		à
T max 30 (°C)		
sur la période	du	au
T moy 30 (°C)		
sur la période	du	au
Nombre d'heures >25°C		
Amoy30 - Tmax30 (°C)		




Suivi piscicole des têtes de bassin versant du département du Rhône 2015 - Atlas

Code station : COLOM-02	Cours d'eau : Colombier	Localisation : Le Colombier, depuis la cloture jusqu'en aval du pont	Date : 08/06/2015
--------------------------------	-------------------------	--	-------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	APP	CHA	LPP	TRFa	TRFj												Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	15	99	13	8	33												168
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																	
Densités estimées (ind/1000m²)		1618	212	98	539												2467
Effectif capturé/estimé (%)		60	60	80	60												67
Biomasses capturées au 1er passage (g)	140	690	48	396	61												1335
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																	
Biomasses estimées (kg/ha)		113	7,8	49	10,0												179
Biomasse capturée/estimée (%)		60	60	80	60												73


Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche



Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Note Indice Poissons Rivière (IPR)					6,4
<= 7	]7-16]	]16-25]	]25-36]	> 36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (NTE)					0,02
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					0,79
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					0,20
Densité totale d'individus (DTI)					2,43
Densité d'individus tolérants (DIT)					0,83
Densité d'individus invertivores (DII)					0,14
Densité d'individus omnivores (DIO)					2,00







Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	6373	58
Très importante	> 7000	> 300
Importante	]4000;7000]	]200;300]
Assez importante	]2200;4000]	]125;200]
Moyenne	]1200;2200]	]75;125]
Assez faible	]700;1200]	]50;75]
Faible	]400;700]	]30;50]
Très faible	< 400	< 30

Peuplement théorique type B 2 (estimé)

Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
(prenant en compte les données de densité et de biomasse)





Le Conan à Bessenay

Code station	CONAN-02	Commune	Bessenay
Cours d'eau	Conan	Localisation	Chinay - fin du parement RM RD
Coordonnées Lambert II de la limite aval	769 747	Objet de la pêche	Sondage
	2 090 259	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	03/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Etiage	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'époussette(s)	2

Caractéristiques de la station

Altitude (m)	410
Distance à la source (km)	5,8
Bassin versant drainé (km²)	13,5
Pente moyenne (‰)	28,2
Longueur (m)	110
Largeur en eau (m)	2,1
Surface de la station (m²)	235
Conductivité (µS/cm)	330




Caractéristiques d'habitat


Ripisylve (% de linéaire)	95
Epaisseur de la ripisylve	droite / Boisement (5-)
Ombrage (% de surface)	85
Abris (% de surface)	2,5




Profondeur de la lame d'eau (m)



Substrats




Faciès d'écoulement



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du	au
T max jour (°C)		le
T max abs (°C)		à
T max 30 (°C)		
sur la période	du	au
T moy 30 (°C)		
sur la période	du	au
Nombre d'heures >25°C		
Amoy30 - Tmax30 (°C)		




Code station : CONAN-02	Cours d'eau : Conan	Localisation : Chinay - fin du parement RM RD jusqu'au pont	Date : 03/06/2015
--------------------------------	----------------------------	--	--------------------------

Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche	APP	TRF _a	TRF _i																Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	3	57	50																110
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																			
Densités estimées (ind/1000m³)		303	354																657
Effectif capturé/estimé (%)		80	60																70
Biomasses capturées au 1er passage (g)	12	2198	75																2285
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																			
Biomasses estimées (kg/ha)		117	5,3																122
Biomasse capturée/estimée (%)		80	60																80


Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Peuplement théorique type B 2,5 (estimé)


 Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
 (prenant en compte les données de densité et de biomasse)

Note Indice Poissons Rivière (IPR) 15,3				
<= 7	17-16	[16-25]	[25-36]	> 36
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise
Scores des métriques de l'IPR				
Nombre total d'espèces (NTE)				4,13
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)				4,21
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)				4,46
Densité totale d'individus (DTI)				0,31
Densité d'individus tolérants (DIT)				0,45
Densité d'individus invertivores (DII)				0,46
Densité d'individus omnivores (DIO)				1,33


Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	6567	122
Très importante	> 7000	> 300
Importante	[4000;7000]	[200;300]
Assez importante	[2200;4000]	[125;200]
Moyenne	[1200;2200]	[75;125]
Assez faible	[700;1200]	[50;75]
Faible	[400;700]	[30;50]
Très faible	< 400	< 30






Le Cosne à Brullioles

Code station	COSNE-02	Commune	Brullioles
Cours d'eau	Cosne	Localisation	aval rétrécissement en roche mère
Coordonnées Lambert II de la limite aval	770 367	Objet de la pêche	Sondage
	2 086 612	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	03/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2

Caractéristiques de la station


Altitude (m)	368
Distance à la source (km)	9,2
Bassin versant drainé (km²)	22,1
Pente moyenne (‰)	46,9
Longueur (m)	82
Largeur en eau (m)	2,1
Surface de la station (m²)	173
Conductivité (µS/cm)	316



Caractéristiques d'habitat


Ripisylve (% de linéaire)	70
Epaisseur de la ripisylve	Forêt (>10m) - 2 rives
Ombrage (% de surface)	75
Abris (% de surface)	5,9

Profondeur de la lame d'eau (m)




Coller une
photo station

Substrats




Faciès d'écoulement



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du	au
T max jour (°C)		le
T max abs (°C)		à
T max 30 (°C)		
sur la période	du	au
T moy 30 (°C)		
sur la période	du	au
Nombre d'heures >25°C		
Amoy30 - Tmax30 (°C)		

Fréquences des classes de températures moyennes journalières sur les 30 jours consécutifs les plus chauds




Code station : COSNE-02	Cours d'eau : Cosne	Localisation : Le Moulin à vent, aval rétrécissement en roche mère	Date : 03/06/2015
-------------------------	---------------------	--	-------------------

Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	TRF _a	TRF _i																Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	19	51																70
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																		
Densités estimées (ind/1000m ³)	137	491																629
Effectif capturé/estimé (%)	66	66																66
Biomasses capturées au 1er passage (g)	1459	122																1581
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																		
Biomasses estimées (kg/ha)	105	12																117
Biomasse capturée/estimée (%)	66	66																76

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche


Peuplement théorique type B 2,5 (estimé)

 Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
 (prenant en compte les données de densité et de biomasse)


Note Indice Poissons Rivière (IPR)

15,2


< 7	17-16]	16-25]	25-36]	> 36
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise


Scores des métriques de l'IPR

Nombre total d'espèces (NTE)	3,46
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)	4,01
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)	3,96
Densité totale d'individus (DTI)	0,76
Densité d'individus tolérants (DIT)	0,84
Densité d'individus invertivores (DII)	0,32
Densité d'individus omnivores (DIO)	1,86

Historique des notes IPR

Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	6285	117
Très importante	> 7000	> 300
Importante	14000;70000]	1200;3000]
Assez importante	12200;40000]	1125;2000]
Moyenne	11200;22000]	1175;1250]
Assez faible	1700;12000]	150;75]
Faible	1400;700]	130;50]
Très faible	< 400	< 30





La Darde-Coise à Larajasse

Code station	DARDE-01	Commune	Larajasse
Cours d'eau	Darde-Coise	Localisation	La Rivoire, du pont jusqu'au bloc
Coordonnées Lambert II de la limite aval	766 813	Objet de la pêche	Sondage
	2 068 294	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	04/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Etiage	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2

Caractéristiques de la station

Altitude (m)	668
Distance à la source (km)	2,7
Bassin versant drainé (km²)	4,2
Pente moyenne (‰)	61,9
Longueur (m)	68
Largeur en eau (m)	1,5
Surface de la station (m²)	103
Conductivité (µS/cm)	174




Caractéristiques d'habitat


Ripisylve (% de linéaire)	10
Epaisseur de la ripisylve	Rangée (1m) - 2 rives
Ombrage (% de surface)	30
Abris (% de surface)	2,7




Profondeur de la lame d'eau (m)



Substrats




Faciès d'écoulement



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du	au	%	Fréquences des classes de températures moyennes journalières sur les 30 jours consécutifs les plus chauds
T max jour (°C)		le		
T max abs (°C)		à		
T max 30 (°C)				
sur la période	du	au		
T moy 30 (°C)				
sur la période	du	au		
Nombre d'heures >25°C				
Amoy30 - Tmax30 (°C)				




Code station : DARDE-01	Cours d'eau : Darde-Coise	Localisation : La Rivoire, du pont jusqu'au bloc BD en face du gros double frêne	Date : 04/06/2015
--------------------------------	---------------------------	--	-------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

[illegible]

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche



Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Peuplement théorique type B 2 (estimé)

Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux

(prenant en compte les données de densité et de biomasse)


Note Indice Poissons Rivière (IPR)	14.4
---	-------------

<= 7	17-16]	16-25]	25-36]	> 36
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise

Scores des métriques de l'IPR


Nombre total d'espèces (NTE)	2,30
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)	2,63
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)	4,23
Densité totale d'individus (DTI)	0,09
Densité d'individus tolérants (DIT)	0,38
Densité d'individus invertivores (DII)	0,30
Densité d'individus omnivores (DIO)	2,68


Historique des notes IPR



Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	7861	172
Très importante	> 10000	> 300
Importante	35500;100001	1200;3001
Assez importante	13200;35500	125;200
Moyenne	11800;3200	175;125
Assez faible	11100;1800	150;75
Faible	1600;1100	130;50
Très faible	< 600	< 30





L'Ergues à Poule les Echarmeaux

Code station	ERGUE-01	Commune	Poule les Echarmeaux
Cours d'eau	Ergues	Localisation	Le Prunier, près amont arbre seul
Coordonnées Lambert II de la limite aval	764 568	Objet de la pêche	Sondage
	2 127 558	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	15/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Faible	Nombre d'épuisette(s)	2

Caractéristiques de la station

Altitude (m)	484
Distance à la source (km)	5,6
Bassin versant drainé (km²)	11,9
Pente moyenne (‰)	17,2
Longueur (m)	93
Largeur en eau (m)	2,6
Surface de la station (m²)	238
Conductivité (µS/cm)	135




Caractéristiques d'habitat


Ripisylve (% de linéaire)	15
Epaisseur de la ripisylve	Rangée (1m) - 2 rives
Ombrage (% de surface)	25
Abris (% de surface)	6,5




Profondeur de la lame d'eau (m)



Substrats




Faciès d'écoulement



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du 01/06/2014	au 15/09/2014
T max jour (°C)	17,8	le 12/06/2014
T max abs (°C)	19,7	à 17:00:00
T max 30 (°C)	17,2	
sur la période	du 07/06/2014	au 06/07/2014
T moy 30 (°C)	15,8	
sur la période	du 07/06/2014	au 06/07/2014
Nombre d'heures >25°C	0	
Amoy30 - Tmax30 (°C)	5,4	




Code station : ERGUE-01	Cours d'eau : Ergues	Localisation : Le Prunier, prés amont arbre seul dans conopéité RG	Date : 15/06/2015
--------------------------------	----------------------	--	-------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche	CHA	LPP	TRF _a	TRF _i								Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	446	38	74	21								579
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)												
Densités estimées (ind/1000m³)	3122	266	339	147								3924
Effectif capturé/estimé (%)	60	60	80	60								60
Biomasses capturées au 1er passage (g)	3192	140	5188	40								8560
Biomasses capturées au 2nd passage (g)												
Biomasses estimées (kg/ha)	223	9,8	272	2,8								508
Biomasse capturée/estimée (%)	60	60	80	60								70

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche



Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche




Note Indice Poissons Rivière (IPR)	9.5
---	------------

<= 7	17-16]	]16-25]	]25-36]	> 36
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise

Scores des métriques de l'IPR

Nombre total d'espèces (NTE)	0,97
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)	1,44
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)	0,48
Densité totale d'individus (DTI)	4,88
Densité d'individus tolérants (DIT)	0,37
Densité d'individus invertivores (DII)	0,03
Densité d'individus omnivores (DIO)	1,34

Historique des notes IPR




Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)




	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	5355	275
Très importante	> 7000	> 300
Importante	14000;7000]	1200;300]
Assez importante	]2200;4000]	]125;200]
Moyenne	]1200;2200]	]75;125]
Assez faible	]700;1200]	]50;75]
Faible	]400;700]	]30;50]
Très faible	< 400	< 30

Peuplement théorique type B 2,5 (estimé)

Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux

(prenant en compte les données de densité et de biomasse)





Le Frelon à Saint Bonnet le Troncy

Code station	FRELO-01	Commune	Saint Bonnet le Troncy
Cours d'eau	Frelon	Localisation	Lacheron, amont gué jusqu'au
Coordonnées Lambert II de la limite aval	759 600	Objet de la pêche	Sondage
	2 120 646	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	10/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2

Caractéristiques de la station

Altitude (m)	516
Distance à la source (km)	2,5
Bassin versant drainé (km²)	2,6
Pente moyenne (‰)	33
Longueur (m)	70
Largeur en eau (m)	1,9
Surface de la station (m²)	133
Conductivité (µS/cm)	88




Caractéristiques d'habitat


Ripisylve (% de linéaire)	5
Epaisseur de la ripisylve	Rangée (1m) - 2 rives
Ombrage (% de surface)	10
Abris (% de surface)	0,4




Profondeur de la lame d'eau (m)



Substrats




Faciès d'écoulement



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du 01/06/2014	au 15/09/2014
T max jour (°C)	16,2	le 10/08/2014
T max abs (°C)	21,4	à 18:00:00
T max 30 (°C)		18,3
sur la période	du 05/06/2014	au 04/07/2014
T moy 30 (°C)		14,7
sur la période	du 17/07/2014	au 15/08/2014
Nombre d'heures >25°C		0
Amoy30 - Tmax30 (°C)		4,8

Fréquences des classes de températures moyennes journalières sur les 30 jours consécutifs les plus chauds




Suivi piscicole des têtes de bassin versant du département du Rhône 2015 - Atlas

Code station : FRELO-01	Cours d'eau : Frelon	Localisation : Lacheron, amont gué jusqu'au gros charme en RG	Date : 10/06/2015
--------------------------------	----------------------	---	-------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	TRFa	TRFj															Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	17	46															63
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																	
Densités estimées (ind/1000m²)	160	576															736
Effectif capturé/estimé (%)	80	60															64
Biomasses capturées au 1er passage (g)	353	53															406
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																	
Biomasses estimées (kg/ha)	33	6,6															40
Biomasse capturée/estimée (%)	80	60															77

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche




Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Peuplement théorique type B 2 (estimé)


Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
(prenant en compte les données de densité et de biomasse)


Note Indice Poissons Rivière (IPR)					17,1
≤ 7	]7-16]	]16-25]	]25-36]	> 36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (NTE)					4,57
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					2,95
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					5,65
Densité totale d'individus (DTI)					0,87
Densité d'individus tolérants (DIT)					0,40
Densité d'individus invertivores (DII)					1,28
Densité d'individus omnivores (DIO)					1,40



Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	7362	40
Très importante	> 7000	> 300
Importante	]4000;7000]	]200;300]
Assez importante	]2200;4000]	]125;200]
Moyenne	]1200;2200]	]75;125]
Assez faible	]700;1200]	]50;75]
Faible	]400;700]	]30;50]
Très faible	< 400	< 30





La Grande Rivière à La Tour de Salvagny

Code station	GRARI-01	Commune	La Tour de Salvagny
Cours d'eau	Grande Rivière	Localisation	Place Pâté, depuis confluence rau
Coordonnées Lambert II de la limite aval	785 110	Objet de la pêche	Sondage
	2 091 400	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	01/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Etiage	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2

Caractéristiques de la station

Altitude (m)	254
Distance à la source (km)	5,7
Bassin versant drainé (km²)	8,8
Pente moyenne (‰)	30,9
Longueur (m)	60
Largeur en eau (m)	2,2
Surface de la station (m²)	132
Conductivité (µS/cm)	510




Caractéristiques d'habitat


Ripisylve (% de linéaire)	100
Epaisseur de la ripisylve	droite / Boisement (5-
Ombrage (% de surface)	80
Abris (% de surface)	2,5




Profondeur de la lame d'eau (m)



Substrats




Faciès d'écoulement



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du 01/06/2014	au 15/09/2014
T max jour (°C)	18,7	le 19/07/2014
T max abs (°C)	19,9	à 19:00:00
T max 30 (°C)		18,0
sur la période	du 14/07/2014	au 12/08/2014
T moy 30 (°C)		17,0
sur la période	du 15/07/2014	au 13/08/2014
Nombre d'heures >25°C		0
Amoy30 - Tmax30 (°C)		3,6



Fréquences des classes de températures moyennes journalières sur les 30 jours consécutifs les plus chauds




Code station : GRARI-01	Cours d'eau : Grande Rivière	Localisation : Place Pâté, depuis confluence rau du Poirier jusqu'au seuil	Date : 01/06/2015
-------------------------	------------------------------	---	-------------------

Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	LOF	PES	PFL	TRF _a	TRF _j												Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	68	3	2	22	3												98
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																	
Densités estimées (ind/1000m ³)	859	38		208	38												1143
Effectif capturé/estimé (%)	68	68		68	68												65
Biomasses capturées au 1er passage (g)	306	28	9	1653	6												2002
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																	
Biomasses estimées (kg/ha)	39	3,5		157	0,8												199
Biomasse capturée/estimée (%)	68	68		68	68												76


Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Note Indice Poissons Rivière (IPR) 20,9				
<= 7	[7-16]	[16-25]	[25-36]	> 36
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise
Scores des métriques de l'IPR				
Nombre total d'espèces (NTE)			2,03	
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)			4,41	
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)			4,95	
Densité totale d'individus (DTI)			0,99	
Densité d'individus tolérants (DIT)			6,25	
Densité d'individus invertivores (DII)			1,00	
Densité d'individus omnivores (DIO)			1,27	


Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	2462	157
Très importante	> 7000	> 300
Importante	[4000;7000]	[200;300]
Assez importante	[2200;4000]	[125;200]
Moyenne	[1200;2200]	[75;125]
Assez faible	[700;1200]	[50;75]
Faible	[400;700]	[30;50]
Très faible	< 400	< 30

Peuplement théorique type B 2,5 (estimé)

 Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
 (prenant en compte les données de densité et de biomasse)




L'Inverse à St Symphorien d'Ozon

Code station	INVER-01	Commune	St Symphorien d'Ozon
Cours d'eau	Inverse	Localisation	Les Cressonnieres, depuis rejet
Coordonnées Lambert II de la limite aval	797 925	Objet de la pêche	Sondage suivi annuel
	2 073 191	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	29/05/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2

Caractéristiques de la station

Altitude (m)	179
Distance à la source (km)	9,4
Bassin versant drainé (km²)	28,6
Pente moyenne (‰)	4
Longueur (m)	80
Largeur en eau (m)	3,4
Surface de la station (m²)	272
Conductivité (µS/cm)	606




Caractéristiques d'habitat


Ripisylve (% de linéaire)	95
Epaisseur de la ripisylve	sement (5-10m) - 2 ri
Ombrage (% de surface)	90
Abris (% de surface)	1,5




Profondeur de la lame d'eau (m)



Substrats




Faciès d'écoulement



Caractéristiques thermiques



Période de suivi	du	au
T max jour (°C)		le
T max abs (°C)		à
T max 30 (°C)		
sur la période	du	au
T moy 30 (°C)		
sur la période	du	au
Nombre d'heures >25°C		
Amoy30 - Tmax30 (°C)		




Code station : INVER-01	Cours d'eau : Inverse	Localisation : Les Cressonnières, depuis rejet bief RG jusqu'à 10m amont 2è	Date : 29/05/2015
--------------------------------	------------------------------	--	--------------------------

Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche


	CHE	GOU	LOF	PER	PES	PSR	VAI										Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	6	60	11	1	1	22	19										120
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																	
Densités estimées (ind/1000m³)	32	315	67	5	6	135	116										677
Effectif capturé/estimé (%)	70	70	60	70	60	60	60										65
Biomasses capturées au 1er passage (g)	644	784	35	204	58	74	30										1829
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																	
Biomasses estimées (kg/ha)	34	41	2,1	11	3,6	4,5	1,8										98
Biomasse capturée/estimée (%)	70	70	60	70	60	60	60										68

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche


Peuplement théorique type B 4,5 (estimé)


 Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
 (prenant en compte les données de densité et de biomasse)


Note Indice Poissons Rivière (IPR)					19,8
<= 7	]7-16]	]16-25]	]25-36]	> 36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (NTE)					1,04
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					8,62
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					5,69
Densité totale d'individus (DTI)					0,34
Densité d'individus tolérants (DIT)					1,42
Densité d'individus invertivores (DII)					0,56
Densité d'individus omnivores (DIO)					2,16


Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	0	0
Très importante	> 7000	> 300
Importante	]4000;7000]	]200;300]
Assez importante	]2200;4000]	]125;200]
Moyenne	]1200;2200]	]75;125]
Assez faible	]700;1200]	]50;75]
Faible	]400;700]	]30;50]
Très faible	< 400	< 30

Suivi piscicole des têtes de bassin versant du département du Rhône 2015 - Atlas



Le Marverand à Saint Julien

Code station	MARVE-03	Commune	Saint Julien
Cours d'eau	Marverand	Localisation	Aval carrière, depuis aval gros
Coordonnées Lambert II de la limite aval	777 333	Objet de la pêche	Sondage
	2 116 370	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	09/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Etiage	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2




Caractéristiques de la station

Altitude (m)	303
Distance à la source (km)	3,2
Bassin versant drainé (km²)	4,2
Pente moyenne (‰)	25
Longueur (m)	85
Largeur en eau (m)	2,0
Surface de la station (m²)	170
Conductivité (µS/cm)	215




Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	95
Epaisseur de la ripisylve	Forêt (>10m) - 2 rives
Ombrage (% de surface)	95
Abris (% de surface)	2,7



Caractéristiques thermiques



Période de suivi	du 21/10/2014	au 22/05/2015
T max jour (°C)	15,3	le 13/05/2015
T max abs (°C)	17,2	à 18:00:00
T max 30 (°C)		14,4
sur la période	du 14/04/2015	au 13/05/2015
T moy 30 (°C)		12,5
sur la période	du 20/04/2015	au 19/05/2015
Nombre d'heures >25°C		0
Amoy30 - Tmax30 (°C)		6,3



Code station : MARVE-03	Cours d'eau : Marverand	Localisation : Aval carrière, depuis aval gros seuil naturel jusqu'au virage RG	Date : 09/06/2015
--------------------------------	-------------------------	---	-------------------

Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche


	TRF _a	TRF _i																	Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	20	103																	123
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																			
Densités estimées (ind/1000m ³)	147	1010																	1157
Effectif capturé/estimé (%)	66	66																	62
Biomasses capturées au 1er passage (g)	1947	150																	2097
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																			
Biomasses estimées (kg/ha)	143	15																	158
Biomasse capturée/estimée (%)	66	66																	76

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Peuplement théorique type B 2 (estimé)


 Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
 (prenant en compte les données de densité et de biomasse)

Note Indice Poissons Rivière (IPR)					15,1
<= 7	17-161	116-251	125-361	> 36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (NTE)					4,16
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					3,33
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					4,34
Densité totale d'individus (DTI)					0,91
Densité d'individus tolérants (DIT)					0,45
Densité d'individus invertivores (DII)					0,24
Densité d'individus omnivores (DIO)					1,09


Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind/ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	11569	158
Très importante	> 7000	> 300
Importante	[4000;7000]	[200;300]
Assez importante	[2200;4000]	[125;200]
Moyenne	[1200;2200]	[75;125]
Assez faible	[700;1200]	[50;75]
Faible	[400;700]	[30;50]
Très faible	< 400	< 30






La Mauvaise à Vauxrenard

Code station	MAUVA-05	Commune	Vauxrenard
Cours d'eau	Mauvaise	Localisation	Les Combières, aval pont et grand
Coordonnées Lambert II de la limite aval	779 327	Objet de la pêche	Sondage
	2 136 705	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	09/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'époussette(s)	2

Caractéristiques de la station

Altitude (m)	365
Distance à la source (km)	3,3
Bassin versant drainé (km²)	3,9
Pente moyenne (‰)	47,7
Longueur (m)	72
Largeur en eau (m)	1,6
Surface de la station (m²)	115
Conductivité (µS/cm)	126




Caractéristiques d'habitat


Ripisylve (% de linéaire)	90
Épaisseur de la ripisylve	Forêt (>10m) - 2 rives
Ombrage (% de surface)	90
Abris (% de surface)	1,5




Profondeur de la lame d'eau (m)



Substrats




Faciès d'écoulement



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du	au
T max jour (°C)		le
T max abs (°C)		à
T max 30 (°C)		
sur la période	du	au
T moy 30 (°C)		
sur la période	du	au
Nombre d'heures >25°C		
Amoy30 - Tmax30 (°C)		




Code station : MAUVA-05	Cours d'eau : Mauvaise	Localisation : Les Combières, aval pont et grand seuil	Date : 09/06/2015
-------------------------	------------------------	--	-------------------

Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	APP	TRF _a	TRF _i															Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	3	9	53															65
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																		
Densités estimées (ind/1000m ²)		99	767															864
Effectif capturé/estimé (%)		66	66															66
Biomasses capturées au 1er passage (g)	56	712	119															887
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																		
Biomasses estimées (kg/ha)		77	17															94
Biomasse capturée/estimée (%)		66	66															66


Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Peuplement théorique type B 2 (estimé)


 Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
 (prenant en compte les données de densité et de biomasse)

Note Indice Poissons Rivière (IPR)					13,6
<= 7	17-161	116-251	125-361	> 36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (NTE)					2,59
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					3,32
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					3,38
Densité totale d'individus (DTI)					0,78
Densité d'individus tolérants (DIT)					1,13
Densité d'individus invertivores (DII)					0,34
Densité d'individus omnivores (DIO)					2,11


Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	8644	94
Très importante	> 10000	> 300
Importante	15500;100000	1200;3000
Assez importante	13200;55000	1125;2000
Moyenne	11800;32000	1175;1250
Assez faible	11100;18000	150;750
Faible	1600;11000	130;500
Très faible	< 600	< 30





Le Mézerin à Echalas

Code station	MEZER-01	Commune	Echalas
Cours d'eau	Mézerin	Localisation	Le Mouillon, amont confluent en
Coordonnées Lambert II de la limite aval	783 967	Objet de la pêche	Sondage
	2 063 754	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	02/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Etiage	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2



Caractéristiques de la station

Altitude (m)	210
Distance à la source (km)	6,8
Bassin versant drainé (km²)	14,2
Pente moyenne (‰)	23,2
Longueur (m)	100
Largeur en eau (m)	1,7
Surface de la station (m²)	172
Conductivité (µS/cm)	273




Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	100
Epaisseur de la ripisylve	Forêt (>10m) - 2 rives
Ombrage (% de surface)	95
Abris (% de surface)	5,2



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du 03/06/2014	au 15/09/2014
T max jour (°C)	17,9	le 10/08/2014
T max abs (°C)	18,7	à 17:00:00
T max 30 (°C)		17,1
sur la période	du 15/07/2014	au 13/08/2014
T moy 30 (°C)		16,5
sur la période	du 17/07/2014	au 15/08/2014
Nombre d'heures >25°C		0
Amoy30 - Tmax30 (°C)		2,6




Code station : MEZER-01	Cours d'eau : Mézerin	Localisation : Le Mouillon, amont confluent en rive gauche.	Date : 02/06/2015
--------------------------------	-----------------------	---	-------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	GOU	TRF	TRFj																Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	1	49	28																78
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																			
Densités estimées (ind/1000m ³)	*	356	271																636
Effectif capturé/estimé (%)	78	68	68																77
Biomasses capturées au 1er passage (g)	28	3799	50																3877
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																			
Biomasses estimées (kg/ha)	2,3	276	4,8																283
Biomasse capturée/estimée (%)	78	68	68																68


Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche



Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche




Note Indice Poissons Rivière (IPR)					13,5
<= 7	17-161	116-251	125-361	> 36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (NTE)					3,10
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					3,85
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					4,33
Densité totale d'individus (DTI)					0,46
Densité d'individus tolérants (DTT)					0,43
Densité d'individus invertivores (DII)					0,19
Densité d'individus omnivores (DIO)					1,13




Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	6274	281
Très importante	> 7000	> 300
Importante	14000;70000	1200;3000
Assez importante	12200;40000	1125;2000
Moyenne	11200;22000	175;125
Assez faible	1700;12000	150;75
Faible	1400;7000	130;50
Très faible	< 400	< 30

Peuplement théorique type B 2,5 (estimé)

 Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
 (prenant en compte les données de densité et de biomasse)




Le Morgon à Cogny

Code station	MORGO-03	Commune	Cogny
Cours d'eau	Morgon	Localisation	Le Ricottier, depuis la cloture
Coordonnées Lambert II de la limite aval	776 054	Objet de la pêche	Sondage
	2 111 184	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	09/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2



Caractéristiques de la station

Altitude (m)	326
Distance à la source (km)	4
Bassin versant drainé (km²)	6,4
Pente moyenne (‰)	29,2
Longueur (m)	80
Largeur en eau (m)	1,5
Surface de la station (m²)	120
Conductivité (µS/cm)	525




Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	20
Épaisseur de la ripisylve	Rangée (1m) - 2 rives
Ombrage (% de surface)	20
Abris (% de surface)	3,4



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du	22/10/2014	au	22/05/2015
T max jour (°C)		14,4	le	13/05/2015
T max abs (°C)		16,3	à	17:00:00
T max 30 (°C)				13,9
sur la période	du	20/04/2015	au	19/05/2015
T moy 30 (°C)				12,2
sur la période	du	20/04/2015	au	19/05/2015
Nombre d'heures >25°C				0
Amoy30 - Tmax30 (°C)				5,5




Code station : MORGO-03	Cours d'eau : Morgon	Localisation : Le Ricottier, depuis la cloture jusqu'en aval du pont	Date : 09/06/2015
--------------------------------	----------------------	--	-------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche	TRF _a	TRF _i																	Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	22	79																	101
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																			
Densités estimées (ind/1000m²)	229	1097																	1326
Effectif capturé/estimé (%)	66	66																	66
Biomasses capturées au 1er passage (g)	1242	141																	1383
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																			
Biomasses estimées (kg/ha)	129	20																	149
Biomasse capturée/estimée (%)	66	66																	77

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche


Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Note Indice Poissons Rivière (IPR)					16,2
<= 7	[7-16]	[16-25]	[25-36]	> 36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (NTE)					3,57
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					3,88
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					4,12
Densité totale d'individus (DTI)					1,74
Densité d'individus tolérants (DIT)					0,88
Densité d'individus invertivores (DII)					0,16
Densité d'individus omnivores (DIO)					1,84


Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	13264	149
Très importante	> 10000	> 300
Importante	[5500;10000]	[200;300]
Assez importante	[3200;5500]	[125;200]
Moyenne	[1800;3200]	[75;125]
Assez faible	[1100;1800]	[50;75]
Faible	[600;1100]	[30;50]
Très faible	< 600	< 30

Peuplement théorique type B 2,5 (estimé)

 Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
 (prenant en compte les données de densité et de biomasse)




Le Nizerand à Denicé




Code station	NIZER-01	Commune	Denicé
Cours d'eau	Nizerand	Localisation	Aval pont bois Belu
Coordonnées Lambert II de la limite aval	777 945	Objet de la pêche	Sondage
	2 114 073	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	09/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Faible	Nombre d'épuisette(s)	2

Caractéristiques de la station

Altitude (m)	275	
Distance à la source (km)	6,7	
Bassin versant drainé (km²)	18,4	
Pente moyenne (‰)	16,7	
Longueur (m)	117	
Largeur en eau (m)	2,7	
Surface de la station (m²)	316	
Conductivité (µS/cm)	327	


Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	80
Épaisseur de la ripisylve	Cordon (1-5m) - 2 rive
Ombrage (% de surface)	75
Abris (% de surface)	1,2



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du	au
T max jour (°C)		le
T max abs (°C)		à
T max 30 (°C)		
sur la période	du	au
T moy 30 (°C)		
sur la période	du	au
Nombre d'heures >25°C		
Amoy30 - Tmax30 (°C)		




Suivi piscicole des têtes de bassin versant du département du Rhône 2015 - Atlas

Code station : NIZER-01	Cours d'eau : Nizerand	Localisation : Aval pont bois Belu	Date : 09/06/2015
--------------------------------	------------------------	------------------------------------	-------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	LOF	PFL	TRFa	TRFJ													Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	13	11	24	54													102
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																	
Densités estimées (ind/1000 m²)	69		95	285													448
Effectif capturé/estimé (%)	60		80	60													72
Biomasses capturées au 1er passage (g)	237	82	1615	150													2084
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																	
Biomasses estimées (kg/ha)	13		64	7,9													84
Biomasse capturée/estimée (%)	60		80	60													78

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche



Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche




Note Indice Poissons Rivière (IPR) 19,7

<= 7	]7-16]	]16-25]	]25-36]	>36
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise

Scores des métriques de l'IPR	
Nombre total d'espèces (NTE)	4,87
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)	5,29
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)	5,83
Densité totale d'individus (DTI)	0,77
Densité d'individus tolérants (DIT)	1,49
Densité d'individus invertivores (DII)	0,88
Densité d'individus omnivores (DIO)	0,53

Historique des notes IPR





Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	3799	72
Très importante	> 7000	> 300
Importante	]4000;7000]	]200;300]
Assez importante	]2200;4000]	]125;200]
Moyenne	]1200;2200]	]75;125]
Assez faible	]700;1200]	]50;75]
Faible	]400;700]	]30;50]
Très faible	< 400	< 30

Peuplement théorique type B 2,5 (estimé)

Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
(prenant en compte les données de densité et de biomasse)





L'Orjolle à Aveize

Code station	ORJOL-03	Commune	Aveize
Cours d'eau	Orjolle	Localisation	l'abreuvoir aménagé jusqu'au grand
Coordonnées Lambert II de la limite aval	768 137	Objet de la pêche	Sondage
	2 079 186	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	03/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2

Caractéristiques de la station


Altitude (m)	552
Distance à la source (km)	2,3
Bassin versant drainé (km²)	3,2
Pente moyenne (‰)	66,5
Longueur (m)	86
Largeur en eau (m)	1,3
Surface de la station (m²)	112
Conductivité (µS/cm)	175



Caractéristiques d'habitat


Ripisylve (% de linéaire)	85
Épaisseur de la ripisylve	cordon (1-5m) - 2 rives
Ombrage (% de surface)	90
Abris (% de surface)	6,6

Profondeur de la lame d'eau (m)




Coller une
photo station

Substrats



Faciès d'écoulement




Suivi piscicole des têtes de bassin versant du département du Rhône 2015 - Atlas

Code station : ORJOL-03	Cours d'eau : Orjolle	Localisation : Orjolle, depuis l'abreuvoir aménagé jusqu'au grand seuil de	Date : 03/06/2015
--------------------------------	-----------------------	--	-------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	APP	TRS	TRFa	TRFj												Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	4	1	34	25												64
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																
Densités estimées (ind/1000m²)		11	380	373												764
Effectif capturé/estimé (%)		80	80	60												75
Biomasses capturées au 1er passage (g)	8	303	1672	15												1998
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																
Biomasses estimées (kg/ha)		34	187	2,2												223
Biomasse capturée/estimée (%)		80	80	60												80


Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche



Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Note Indice Poissons Rivière (IPR)					12,8
<= 7	[7-16]	[16-25]	[25-36]	>36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (NTE)					2,07
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					2,99
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					3,07
Densité totale d'individus (DTI)					0,46
Densité d'individus tolérants (DIT)					1,20
Densité d'individus invertivores (DII)					0,52
Densité d'individus omnivores (DIO)					2,54





Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	7528	189
Très importante	> 10000	> 300
Importante	[5500;10000]	[200;300]
Assez importante	[3200;5500]	[125;200]
Moyenne	[1800;3200]	[75;125]
Assez faible	[1100;1800]	[50;75]
Faible	[600;1100]	[30;50]
Très faible	< 600	< 30

Peuplement théorique type B 2 (estimé)

Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
(prenant en compte les données de densité et de biomasse)





Le Pelot à Saint Christophe

Code station	PELOT-01	Commune	St christophe
Cours d'eau	Pelot	Localisation	Les Vernes, aval plan d'eau, de
Coordonnées Lambert II de la limite aval	768 709	Objet de la pêche	Sondage
	2 142 625	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	08/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2

Caractéristiques de la station

Altitude (m)	499
Distance à la source (km)	2,2
Bassin versant drainé (km²)	3,2
Pente moyenne (‰)	57
Longueur (m)	110
Largeur en eau (m)	1,4
Surface de la station (m²)	154
Conductivité (µS/cm)	96




Caractéristiques d'habitat


Ripisylve (% de linéaire)	5
Epaisseur de la ripisylve	Rangée (1m) - 2 rives
Ombrage (% de surface)	10
Abris (% de surface)	4,2




Profondeur de la lame d'eau (m)



Substrats




Faciès d'écoulement




Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du 01/06/2014	au 15/09/2014
T max jour (°C)	18,9	le 12/06/2014
T max abs (°C)	22,6	à 16:00:00
T max 30 (°C)		19,5
sur la période	du 07/06/2014	au 06/07/2014
T moy 30 (°C)		17,1
sur la période	du 07/06/2014	au 06/07/2014
Nombre d'heures >25°C		0
Amoy30 - Tmax30 (°C)		7,6

Fréquences des classes de températures moyennes journalières sur les 30 jours consécutifs les plus chauds



Suivi piscicole des têtes de bassin versant du département du Rhône 2015 - Atlas



Le Potensinet à Larajasse

Code station	POTEN-02	Commune	Larajasse
Cours d'eau	Potensinet	Localisation	Les Bouthières, depuis petite
Coordonnées Lambert II de la limite aval	770 780	Objet de la pêche	Sondage
	2 072 451	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	04/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2




Caractéristiques de la station

Altitude (m)	575
Distance à la source (km)	10,7
Bassin versant drainé (km²)	24,9
Pente moyenne (‰)	9
Longueur (m)	83
Largeur en eau (m)	2,7
Surface de la station (m²)	225
Conductivité (µS/cm)	221




Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	80
Epaisseur de la ripisylve	Rangée (1m) - 2 rives
Ombrage (% de surface)	90
Abris (% de surface)	3,6



Caractéristiques thermiques



Période de suivi	du	au
T max jour (°C)		le
T max abs (°C)		à
T max 30 (°C)		
sur la période	du	au
T moy 30 (°C)		
sur la période	du	au
Nombre d'heures >25°C		
Amoy30 - Tmax30 (°C)		



Code station : POTEN-02	Cours d'eau : Potensinet	Localisation : Les Bouthières, depuis petite fosse 3m aval haie jusqu'à	Date : 04/06/2015
--------------------------------	--------------------------	---	-------------------

Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche


	GOU	LOF	PFL	VAI	TRF _a	TRF _j											Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	3	76	3	26	7	18											133
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																	
Densités estimées (ind/1000m ³)	19	563		193	39	133											947
Effectif capturé/estimé (%)	70	60		60	60	60											62
Biomasses capturées au 1er passage (g)	74	306	50	236	525	49											1240
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																	
Biomasses estimées (kg/ha)	4,7	23		17	29	3,6											78
Biomasse capturée/estimée (%)	70	60		60	60	60											71

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Peuplement théorique type B 3,5 (estimé)


 Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
 (prenant en compte les données de densité et de biomasse)

Note Indice Poissons Rivière (IPR)					18,6
<= 7	]7-16]	]16-25]	]25-36]	> 36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (NTE)					1,77
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					4,34
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					4,27
Densité totale d'individus (DTI)					0,16
Densité d'individus tolérants (DIT)					3,72
Densité d'individus invertivores (DII)					3,38
Densité d'individus omnivores (DIO)					0,99


Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	1723	33
Très importante	> 7000	> 300
Importante	]4000;7000]	]200;300]
Assez importante	]2200;4000]	]125;200]
Moyenne	]1200;2200]	]75;125]
Assez faible	]700;1200]	]50;75]
Faible	]400;700]	]30;50]
Très faible	< 400	< 30





Le Rochefort à Saint Vincent de Reins

Code station	ROCHE-01	Commune	Saint Vincent de Reins
Cours d'eau	Rochefort	Localisation	Le Replat, aval frêne isolé en RG
Coordonnées Lambert II de la limite aval	758 738	Objet de la pêche	Sondage
	2 121 202	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	10/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2




Caractéristiques de la station

Altitude (m)	530
Distance à la source (km)	1,7
Bassin versant drainé (km²)	2,3
Pente moyenne (‰)	45,4
Longueur (m)	100
Largeur en eau (m)	0,9
Surface de la station (m²)	90
Conductivité (µS/cm)	114




Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	0
Epaisseur de la ripisylve	
Ombrage (% de surface)	0
Abris (% de surface)	1,2



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du	au
T max jour (°C)		le
T max abs (°C)		à
T max 30 (°C)		
sur la période	du	au
T moy 30 (°C)		
sur la période	du	au
Nombre d'heures >25°C		
Amoy30 - Tmax30 (°C)		




Code station : ROCHE-01	Cours d'eau : Rochefort	Localisation : Le Replat, aval frêne isolé en RG	Date : 10/06/2015
--------------------------------	-------------------------	--	-------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	TRF _a	TRF _i																Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	38	8																46
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																		
Densités estimées (ind/1000m ²)	52*	14*																67*
Effectif capturé/estimé (%)	69	69																76
Biomasses capturées au 1er passage (g)	992	10																992
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																		
Biomasses estimées (kg/ha)	136	1,9																138
Biomasse capturée/estimée (%)	69	69																69

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche




Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Peuplement théorique type B 1,5 (estimé)


Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
(prenant en compte les données de densité et de biomasse)


Note Indice Poissons Rivière (IPR)					14,9
<= 7	17-16	16-25	25-36	> 36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (MTE)					3,22
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					2,70
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					4,48
Densité totale d'individus (DTI)					0,50
Densité d'individus tolérants (DIT)					0,83
Densité d'individus invertivores (DII)					1,13
Densité d'individus omnivores (DIO)					2,04



Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	6759	138
Très importante	> 10000	> 300
Importante	15500;100000	1200;3000
Assez importante	13200;55000	1125;2000
Moyenne	11800;32000	175;125
Assez faible	11100;18000	150;75
Faible	1600;11000	130;50
Très faible	< 600	< 30





Le Ronçon à Saint Bonnet le Troncy

Code station	RONCO-01	Commune	Saint Bonnet le Troncy
Cours d'eau	Ronçon	Localisation	Le Munal, depuis le méandre RG
Coordonnées Lambert II de la limite aval	760 105	Objet de la pêche	Sondage
	2 119 094	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	10/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2

Caractéristiques de la station


Altitude (m)	503	
Distance à la source (km)	6,7	
Bassin versant drainé (km²)	12,3	
Pente moyenne (‰)	17,5	
Longueur (m)	98	
Largeur en eau (m)	2,2	
Surface de la station (m²)	216	
Conductivité (µS/cm)	34	

Caractéristiques d'habitat


Ripisylve (% de linéaire)	10
Epaisseur de la ripisylve	Rangée (1m) - 2 rives
Ombrage (% de surface)	75
Abris (% de surface)	1,3




Profondeur de la lame d'eau (m)



Substrats




Faciès d'écoulement



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du 01/06/2014	au 15/09/2014
T max jour (°C)	19,4	le 03/07/2014
T max abs (°C)	25,0	à 17:00:00
T max 30 (°C)		21,7
sur la période	du 06/06/2014	au 05/07/2014
T moy 30 (°C)		17,5
sur la période	du 07/06/2014	au 06/07/2014
Nombre d'heures >25°C		0
Amoy30 - Tmax30 (°C)		10,6



Fréquences des classes de températures moyennes journalières sur les 30 jours consécutifs les plus chauds




Code station : RONCO-01	Cours d'eau : Ronçon	Localisation : Le Munal, depuis le méandre RG (amont du bois)	Date : 10/06/2015
-------------------------	----------------------	---	-------------------

Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche


	VAI	CHA	CHE	LOF	LPP	TRF _a	TRF _i									Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	47	40	8	29	10	49	39									222
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																
Densités estimées (ind/1000m ²)	363	309	46	224	77	284	301									1606
Effectif capturé/estimé (%)	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6									6,6
Biomasses capturées au 1er passage (g)	166	172	597	146	20	1916	97									3114
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																
Biomasses estimées (kg/ha)	13	13	35	11	1,5	111	7,5									192
Biomasse capturée/estimée (%)	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6									7,5

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Note Indice Poissons Rivière (IPR)					12,9
<= 7	17-161	116-251	125-361	> 36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (MTE)					2,03
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					0,75
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					0,23
Densité totale d'individus (DTI)					1,02
Densité d'individus tolérants (DIT)					3,50
Densité d'individus invertivores (DII)					0,76
Densité d'individus omnivores (DIO)					4,65


Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	5856	119
Très importante	> 10000	> 300
Importante	15500;100000	1200;3000
Assez importante	13200;55000	1125;2000
Moyenne	11800;32000	1175;1250
Assez faible	11100;18000	150;750
Faible	1600;11000	130;500
Très faible	< 600	< 30

Peuplement théorique type B 3 (estimé)
Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
 (prenant en compte les données de densité et de biomasse)


Suivi piscicole des têtes de bassin versant du département du Rhône 2015 - Atlas



Le Rossand à Montromant

Code station	ROSSA-02	Commune	Montromant
Cours d'eau	Rossand	Localisation	Grand Champ - Moulin depuis la
Coordonnées Lambert II de la limite aval	769 955	Objet de la pêche	Sondage
	2 081 473	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	03/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2



Caractéristiques de la station

Altitude (m)	446
Distance à la source (km)	3,5
Bassin versant drainé (km²)	11,1
Pente moyenne (‰)	38,5
Longueur (m)	125
Largeur en eau (m)	2,7
Surface de la station (m²)	338
Conductivité (µS/cm)	186




Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	60
Epaisseur de la ripisylve	ve droite / Cordon (1-5)
Ombrage (% de surface)	60
Abris (% de surface)	1,8



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du 01/06/2014	au 15/09/2014
T max jour (°C)	17,2	le 10/08/2014
T max abs (°C)	18,2	à 17:00:00
T max 30 (°C)		16,3
sur la période	du 14/07/2014	au 12/08/2014
T moy 30 (°C)		15,5
sur la période	du 14/07/2014	au 12/08/2014
Nombre d'heures >25°C		0
Amoy30 - Tmax30 (°C)		2,8




Suivi piscicole des têtes de bassin versant du département du Rhône 2015 - Atlas

Code station : ROSSA-02	Cours d'eau : Rossand	Localisation : Grand Champ - Moulin depuis la fenêtre du bâtiment jusqu'au	Date : 03/06/2015
--------------------------------	------------------------------	---	--------------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	TRFa	TRFj														Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	93	43														136
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																
Densités estimées (ind/1000m²)	344	212														557
Effectif capturé/estimé (%)	80	60														72
Biomasses capturées au 1er passage (g)	3397	51														3448
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																
Biomasses estimées (kg/ha)	126	2,5														128
Biomasse capturée/estimée (%)	80	60														80


Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche



Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Note Indice Poissons Rivière (IPR)					12,3
<= 7	[7-16]	[16-25]	[25-36]	> 36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (NTE)					2,73
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					3,47
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					3,53
Densité totale d'individus (DTI)					0,33
Densité d'individus tolérants (DIT)					0,49
Densité d'individus invertivores (DII)					0,52
Densité d'individus omnivores (DIO)					1,20





Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	5568	128
Très importante	> 7000	> 300
Importante	[4000;7000]	[200;300]
Assez importante	[2200;4000]	[125;200]
Moyenne	[1200;2200]	[75;125]
Assez faible	[700;1200]	[50;75]
Faible	[400;700]	[30;50]
Très faible	< 400	< 30

Peuplement théorique type B 2,5 (estimé)

Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
(prenant en compte les données de densité et de biomasse)





Le Rosson à Larajasse

Code station	ROSSO-01	Commune	Larajasse
Cours d'eau	Rosson	Localisation	La Petite Chazotte, depuis les 6
Coordonnées Lambert II de la limite aval	767 527	Objet de la pêche	Sondage
	2 071 146	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	04/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2

Caractéristiques de la station

Altitude (m)	540
Distance à la source (km)	4,2
Bassin versant drainé (km²)	6,8
Pente moyenne (‰)	39,6
Longueur (m)	61
Largeur en eau (m)	2,4
Surface de la station (m²)	146
Conductivité (µS/cm)	202




Caractéristiques d'habitat


Ripisylve (% de linéaire)	60
Épaisseur de la ripisylve	Rangée (1m) - 2 rives
Ombrage (% de surface)	80
Abris (% de surface)	2,9




Profondeur de la lame d'eau (m)



Substrats




Faciès d'écoulement



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du	au
T max jour (°C)		le
T max abs (°C)		à
T max 30 (°C)		
sur la période	du	au
T moy 30 (°C)		
sur la période	du	au
Nombre d'heures >25°C		
Amoy30 - Tmax30 (°C)		



Fréquences des classes de températures moyennes journalières sur les 30 jours consécutifs les plus chauds




Code station : ROSSO-01	Cours d'eau : Rosson	Localisation : La Petite Chazotte, depuis les 6 troncs d'aune RD jusqu'au seuil	Date : 04/06/2015
-------------------------	----------------------	---	-------------------

Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	GOU	LOF	VAI	TRF _a	TRF _i												Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	1	15	2	14	18												50
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																	
Densités estimées (ind/1000m ²)	10	171	23	120	205												528
Effectif capturé/estimé (%)	70	60	60	80	60												65
Biomasses capturées au 1er passage (g)	21	162	18	1104	45												1350
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																	
Biomasses estimées (kg/ha)	2,0	18	2,0	94	5,1												122
Biomasse capturée/estimée (%)	70	60	60	80	60												76


Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Note Indice Poissons Rivière (IPR)					13,7
<= 7	17-161	116-251	125-361	> 36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (MTE)					0,53
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					2,96
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					2,17
Densité totale d'individus (DTI)					0,84
Densité d'individus tolérants (DIT)					3,38
Densité d'individus invertivores (DII)					1,93
Densité d'individus omnivores (DIO)					1,82


Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	3245	99
Très importante	> 7000	> 300
Importante	]4000;7000]	]200;300]
Assez importante	]2200;4000]	]125;200]
Moyenne	]1200;2200]	]75;125]
Assez faible	]700;1200]	]50;75]
Faible	]400;700]	]30;50]
Très faible	< 400	< 30

Peuplement théorique type B 2,5 (estimé)

 Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
 (prenant en compte les données de densité et de biomasse)




Le Ry à Grandis

Code station	RY-01	Commune	Grandis
Cours d'eau	Ry	Localisation	Les Planches, amont
Coordonnées Lambert II de la limite aval	765 537	Objet de la pêche	Sondage
	2 117 113	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	15/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2



Caractéristiques de la station

Altitude (m)	384
Distance à la source (km)	5,1
Bassin versant drainé (km²)	11,8
Pente moyenne (‰)	23,5
Longueur (m)	82
Largeur en eau (m)	2,2
Surface de la station (m²)	180
Conductivité (µS/cm)	124




Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	50
Épaisseur de la ripisylve	Rangée (1m) - 2 rives
Ombrage (% de surface)	50
Abris (% de surface)	3,7



Caractéristiques thermiques



Période de suivi	du	au
T max jour (°C)		le
T max abs (°C)		à
T max 30 (°C)		
sur la période	du	au
T moy 30 (°C)		
sur la période	du	au
Nombre d'heures >25°C		
Amoy30 - Tmax30 (°C)		



Code station : RY-01	Cours d'eau : Ry	Localisation : Les Planches, amont enrochements (poteau PTT)	Date : 15/06/2015
----------------------	------------------	--	-------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	CHA	TRF _a	TRF _i															Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	7	84	79															170
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																		
Densités estimées (ind/1000m ³)	65	542	730															1377
Effectif capturé/estimé (%)	60	60	60															60
Biomasses capturées au 1er passage (g)	32	3348	196															3576
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																		
Biomasses estimées (kg/ha)	3,0	232	18															253
Biomasse capturée/estimée (%)	60	60	60															70

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche

Note Indice Poissons Rivière (IPR) 9,6


<= 7	17-161	116-251	125-361	> 36
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise


Scores des métriques de l'IPR	
Nombre total d'espèces (NTE)	2,34
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)	1,43
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)	1,77
Densité totale d'individus (DTI)	1,90
Densité d'individus tolérants (DIT)	0,54
Densité d'individus invertivores (DII)	0,15
Densité d'individus omnivores (DIO)	1,50

Historique des notes IPR

Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	13119	250
Très importante	> 7000	> 300
Importante	14000;70000	1200;3000
Assez importante	12200;40000	1125;2000
Moyenne	11200;22000	175;1250
Assez faible	1700;12000	150;750
Faible	1400;7000	130;500
Très faible	< 400	< 30

Peuplement théorique type B 2,5 (estimé)

 Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
 (prenant en compte les données de densité et de biomasse)




Le Soanan à Valsonne

Code station	SOANA-07	Commune	Valsonne
Cours d'eau	Soanan	Localisation	Le Sadot, 50m aval RD13
Coordonnées Lambert II de la limite aval	761 606	Objet de la pêche	Sondage
	2 109 910	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	12/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Etiage	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2

Caractéristiques de la station

Altitude (m)	560
Distance à la source (km)	2,7
Bassin versant drainé (km²)	4,6
Pente moyenne (‰)	50
Longueur (m)	50
Largeur en eau (m)	1,6
Surface de la station (m²)	80
Conductivité (µS/cm)	127




Caractéristiques d'habitat


Ripisylve (% de linéaire)	50
Epaisseur de la ripisylve	Rangée (1m) - 2 rives
Ombrage (% de surface)	85
Abris (% de surface)	2,1




Profondeur de la lame d'eau (m)



Substrats




Faciès d'écoulement



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du 01/06/2014	au 15/09/2014
T max jour (°C)	17,2	le 10/08/2014
T max abs (°C)	19,6	à 16:00:00
T max 30 (°C)		17,6
sur la période	du 07/06/2014	au 06/07/2014
T moy 30 (°C)		15,5
sur la période	du 14/07/2014	au 12/08/2014
Nombre d'heures >25°C		0
Amoy30 - Tmax30 (°C)		2,8




Code station : SOANA-07	Cours d'eau : Soanan	Localisation : Le Sadot, 50m aval RD13	Date : 12/06/2015
--------------------------------	----------------------	--	-------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	APP	CHA	TRFa	TRFj																Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	3	10	46	16																75
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																				
Densités estimées (ind/1000m ²)		208	719	333																1260
Effectif capturé/estimé (%)		60	60	60																70
Biomasses capturées au 1er passage (g)	28	100	829	19																976
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																				
Biomasses estimées (kg/ha)		21	130	4,0																154
Biomasse capturée/estimée (%)		60	60	60																70

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche




Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Peuplement théorique type B 2 (estimé)


Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
(prenant en compte les données de densité et de biomasse)

Note Indice Poissons Rivière (IPR)					9,0
<= 7	17-16]	16-25]	25-36]	> 36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (MTE)					0,36
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					0,60
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					0,78
Densité totale d'individus (DTI)					1,90
Densité d'individus tolérants (DIT)					1,73
Densité d'individus invertivores (DII)					0,23
Densité d'individus omnivores (DIO)					3,40




Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	10521	133
Très importante	> 10000	> 300
Importante	]5500;10000]	]200;300]
Assez importante	]3200;5500]	]125;200]
Moyenne	]1800;3200]	]75;125]
Assez faible	]1100;1800]	]50;75]
Faible	]600;1100]	]30;50]
Très faible	< 600	< 30



Suivi piscicole des têtes de bassin versant du département du Rhône 2015 - Atlas



Le Sornin à Aigueperse

Code station	SORAI-01	Commune	Aigueperse
Cours d'eau	Sornin d'Aigueperse	Localisation	Moulin de la Barre, amont pont,
Coordonnées Lambert II de la limite aval	760 519	Objet de la pêche	Sondage
	2 143 665	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	11/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2




Caractéristiques de la station

Altitude (m)	427
Distance à la source (km)	5,4
Bassin versant drainé (km²)	19,9
Pente moyenne (‰)	6,6
Longueur (m)	65
Largeur en eau (m)	2,1
Surface de la station (m²)	137
Conductivité (µS/cm)	111




Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	0
Épaisseur de la ripisylve	
Ombrage (% de surface)	0
Abris (% de surface)	1,3



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du	29/10/2014	au	12/05/2015
T max jour (°C)		14,7	le	04/05/2015
T max abs (°C)		19,5	à	17:00:00
T max 30 (°C)				16,0
sur la période	du	13/04/2015	au	12/05/2015
T moy 30 (°C)				12,4
sur la période	du	13/04/2015	au	12/05/2015
Nombre d'heures >25°C				0
Amoy30 - Tmax30 (°C)				10,5




Suivi piscicole des têtes de bassin versant du département du Rhône 2015 - Atlas

Code station : SORAI-01	Cours d'eau : Sornin d'Aigueperse	Localisation : Moulin de la Barre, amont pont, de la barrière à la barrière	Date : 11/06/2015
--------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	CHA	GOU	LOF	VAI	TRFa	TRFj	CHE									Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	2	3	28	58	12	6	8									117
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																
Densités estimées (ind/1000 m²)	24	27	342	708	110	73	73									1358
Effectif capturé/estimé (%)	60	80	60	60	80	60	80									63
Biomasses capturées au 1er passage (g)	23	71	170	166	383	8	1070									1891
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																
Biomasses estimées (kg/ha)	2,8	6,5	21	20	35	1,0	98									184
Biomasse capturée/estimée (%)	60	80	60	60	80	60	80									75


Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche



Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Note Indice Poissons Rivière (IPR)					13,5
<= 7	7-16	16-25	25-36	>36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (NTE)					0,36
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					1,18
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					1,70
Densité totale d'individus (DTI)					0,27
Densité d'individus tolérants (DIT)					2,94
Densité d'individus invertivores (DII)					2,82
Densité d'individus omnivores (DIO)					4,27







Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	1832	36
Très importante	> 10000	> 300
Importante	]5500;10000]	]200;300]
Assez importante	]3200;5500]	]125;200]
Moyenne	]1800;3200]	]75;125]
Assez faible	]1100;1800]	]50;75]
Faible	]600;1100]	]30;50]
Très faible	< 600	< 30

Peuplement théorique type B 3,5 (estimé)

Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
(prenant en compte les données de densité et de biomasse)





Le Sornin à St Igny de Vers

Code station	SORIG-01	Commune	St Igny de Vers
Cours d'eau	Sornin de St Igny	Localisation	Les Janets, aval concavité RD
Coordonnées Lambert II de la limite aval	761 361 2 140 401	Objet de la pêche	Sondage
Date de pêche	11/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2



Caractéristiques de la station

Altitude (m)	493
Distance à la source (km)	6,3
Bassin versant drainé (km²)	13,3
Pente moyenne (‰)	16
Longueur (m)	85
Largeur en eau (m)	2,3
Surface de la station (m²)	196
Conductivité (µS/cm)	95




Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	40
Epaisseur de la ripisylve	cordon (1-5m) - 2 rive
Ombrage (% de surface)	60
Abris (% de surface)	4,9



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du 01/06/2014	au 15/06/2014
T max jour (°C)	18,7	le 13/06/2014
T max abs (°C)	23,2	à 16:00:00
T max 30 (°C)		20,5
sur la période	du 06/06/2014	au 05/07/2014
T moy 30 (°C)		17,0
sur la période	du 07/06/2014	au 06/07/2014
Nombre d'heures >25°C		0
Amoy30 - Tmax30 (°C)		8,4




Code station : SORIG-01	Cours d'eau : Sornin de St Igny	Localisation : Les Janets, aval concavité RD jusque 15m amont du pont (bloc)	Date : 11/06/2015
--------------------------------	--	---	--------------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	CHA	CHE	LOF	PER	TRF _a	TRF _j												Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	19	1	15	1	47	106												189
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																		
Densités estimées (ind/1000m ³)	162	6	128	6	301	904												1507
Effectif capturé/estimé (%)	60	80	60	80	80	60												64
Biomasses capturées au 1er passage (g)	145	233	130	36	2637	225												3406
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																		
Biomasses estimées (kg/ha)	12	15	11	2,3	169	19												228
Biomasse capturée/estimée (%)	60	80	60	80	80	60												74


Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche



Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Peuplement théorique type B 3,5 (estimé)


 Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
(prenant en compte les données de densité et de biomasse)


Note Indice Poissons Rivière (IPR)

9,8

< 7	17-161	116-251	125-361	> 361
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise
Scores des métriques de l'IPR				
Nombre total d'espèces (NTE)				0,42
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)				0,75
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)				3,35
Densité totale d'individus (DTI)				0,67
Densité d'individus tolérants (DIT)				2,18
Densité d'individus invertivores (DII)				0,48
Densité d'individus omnivores (DIO)				1,95


Historique des notes IPR



Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	12042	188
Très importante	> 7000	> 300
Importante	14000;70000	1200;3000
Assez importante	12200;40000	1125;2000
Moyenne	11200;22000	175;125
Assez faible	1700;12000	150;75
Faible	1400;7000	130;50
Très faible	< 400	< 30

Suivi piscicole des têtes de bassin versant du département du Rhône 2015 - Atlas



Le Sornin à Propières




Code station	SORPR-02	Commune	Propières
Cours d'eau	Sornin de Propières	Localisation	Théodon, amont busage, de la
Coordonnées Lambert II de la limite aval	762 920	Objet de la pêche	Sondage
	2 135 318	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	11/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2

Caractéristiques de la station


Altitude (m)	578	
Distance à la source (km)	1,5	
Bassin versant drainé (km²)	3,3	
Pente moyenne (‰)	37,2	
Longueur (m)	78	
Largeur en eau (m)	1,4	
Surface de la station (m²)	109	
Conductivité (µS/cm)	53	

Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	90
Epaisseur de la ripisylve	ve droite / Cordon (1-5)
Ombrage (% de surface)	95
Abris (% de surface)	2,1



Caractéristiques thermiques


Période de suivi	du 14/06/2014	au 15/09/2014	
T max jour (°C)	16,0	le 22/06/2014	Fréquences des classes de températures moyennes journalières sur les 30 jours consécutifs les plus chauds 
T max abs (°C)	19,7	à 18:00:00	
T max 30 (°C)		16,7	
sur la période	du 14/06/2014	au 13/07/2014	
T moy 30 (°C)		14,5	
sur la période	du 14/06/2014	au 13/07/2014	
Nombre d'heures >25°C		0	
Amoy30 - Tmax30 (°C)		6,7	

Code station : SORPR-02	Cours d'eau : Sornin de Propières	Localisation : Théodon, amont busage de la cloture jusqu'à la touffe de cyrpe	Date : 11/06/2015
-------------------------	-----------------------------------	---	-------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	TRF _a	TRF _i															Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	58	12															70
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																	
Densités estimées (ind/1000m ²)	664	183															847
Effectif capturé/estimé (%)	88	66															76
Biomasses capturées au 1er passage (g)	1210	26															1236
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																	
Biomasses estimées (kg/ha)	139	4,0															142
Biomasse capturée/estimée (%)	88	66															76

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche




Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Peuplement théorique type B 2 (estimé)


Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
(prenant en compte les données de densité et de biomasse)


Note Indice Poissons Rivière (IPR)					13,3
<= 7	17-161	116-251	125-361	> 36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (NTE)					2,72
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					2,62
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					4,07
Densité totale d'individus (DTI)					0,05
Densité d'individus tolérants (DIT)					0,88
Densité d'individus invertivores (DII)					0,86
Densité d'individus omnivores (DIO)					2,08



Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	8471	142
Très importante	> 10000	> 300
Importante	15500;100001	1200;3001
Assez importante	13200;55001	1125;2001
Moyenne	11800;32001	175;1251
Assez faible	11100;18001	150;751
Faible	1600;11001	130;501
Très faible	< 600	< 30





Le Saint Didier à la Vouzelle

Code station	STDID-01	Commune	St Didier sur Beaujeu
Cours d'eau	Saint Didier	Localisation	La Vouzelle, amont pont
Coordonnées Lambert II de la limite aval	771 961	Objet de la pêche	Sondage
	2 131 668	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	09/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2



Caractéristiques de la station

Altitude (m)	345
Distance à la source (km)	5,9
Bassin versant drainé (km²)	14,4
Pente moyenne (‰)	19,3
Longueur (m)	80
Largeur en eau (m)	2,1
Surface de la station (m²)	168
Conductivité (µS/cm)	125




Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	90
Epaisseur de la ripisylve	cordon (1-5m) - 2 rive
Ombrage (% de surface)	90
Abris (% de surface)	2,3



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du	21/10/2014	au	22/05/2015
T max jour (°C)		15,8	le	13/05/2015
T max abs (°C)		18,4	à	19:00:00
T max 30 (°C)				14,2
sur la période	du	20/04/2015	au	19/05/2015
T moy 30 (°C)				12,5
sur la période	du	14/06/2014	au	19/05/2015
Nombre d'heures >25°C				0
Amoy30 - Tmax30 (°C)				5,7




Code station : STDID-01	Cours d'eau : Saint Didier	Localisation : La Vouzelle, amont pont	Date : 09/06/2015
-------------------------	----------------------------	--	-------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	CHA	GOU	LOF	LPP	TRS	TRF ₂	TRF ₁										Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	47	3	1	7	1	27	7										93
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																	
Densités estimées (ind/1000m ²)	466	26	10	69	7	201	69										349
Effectif capturé/estimé (%)	6,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0										6,5
Biomasses capturées au 1er passage (g)	586	22	3	12	223	816	15										1677
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																	
Biomasses estimées (kg/ha)	58	1,9	0,3	1,2	17	61	1,5										140
Biomasse capturée/estimée (%)	6,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0										7,1

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche




Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Peuplement théorique type B 3 (estimé)


Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
(prenant en compte les données de densité et de biomasse)


Note Indice Poissons Rivière (IPR)					6,1
< 7	[7-16]	[16-25]	[25-36]	> 36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (MTE)					0,65
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					1,62
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					0,57
Densité totale d'individus (DTI)					0,58
Densité d'individus tolérants (DIT)					0,90
Densité d'individus invertivores (DII)					0,36
Densité d'individus omnivores (DIO)					1,46



Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	2703	62
Très importante	> 7000	> 300
Importante	[4000;7000]	[200;300]
Assez importante	[2200;4000]	[125;200]
Moyenne	[1200;2200]	[75;125]
Assez faible	[700;1200]	[50;75]
Faible	[400;700]	[30;50]
Très faible	< 400	< 30





Le Thel à Ouroux

Code station	THEL-01	Commune	Ouroux
Cours d'eau	Thel	Localisation	La Braille, confluence jusqu'au
Coordonnées Lambert II de la limite aval	774 413	Objet de la pêche	Sondage
	2 137 755	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	08/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Faible	Nombre d'épuisette(s)	2




Caractéristiques de la station

Altitude (m)	483
Distance à la source (km)	2,9
Bassin versant drainé (km²)	3,7
Pente moyenne (‰)	40,5
Longueur (m)	115
Largeur en eau (m)	1,5
Surface de la station (m²)	173
Conductivité (µS/cm)	84




Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	65
Epaisseur de la ripisylve	Cordon (1-5m) - 2 rives
Ombrage (% de surface)	80
Abris (% de surface)	5,1



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du	au
T max jour (°C)		le
T max abs (°C)		à
T max 30 (°C)		
sur la période	du	au
T moy 30 (°C)		
sur la période	du	au
Nombre d'heures >25°C		
Amoy30 - Tmax30 (°C)		




Code station : THEL-01	Cours d'eau : Thel	Localisation : La Braille, confluence jusqu'au seuil en amont du pont	Date : 08/06/2015
-------------------------------	---------------------------	--	--------------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	CHA	TRF _a	TRF _i															Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	25	29	47															101
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																		
Densités estimées (ind/1000m ³)	242	210	454															906
Effectif capturé/estimé (%)	60	60	60															65
Biomasses capturées au 1er passage (g)	200	683	70															953
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																		
Biomasses estimées (kg/ha)	19	49	6,8															76
Biomasse capturée/estimée (%)	60	60	60															75


Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche



Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche




Note Indice Poissons Rivière (IPR) 6,5				
< 7	[7-16]	[16-25]	[25-36]	> 36
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise
Scores des métriques de l'IPR				
Nombre total d'espèces (NTE)				1,37
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)				0,91
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)				1,26
Densité totale d'individus (DTI)				0,34
Densité d'individus tolérants (DIT)				0,57
Densité d'individus invertivores (DII)				0,48
Densité d'individus omnivores (DIO)				1,53




Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	6643	56
Très importante	> 10000	> 300
Importante	[5500;10000]	[200;300]
Assez importante	[3200;5500]	[125;200]
Moyenne	[1800;3200]	[75;125]
Assez faible	[1100;1800]	[50;75]
Faible	[600;1100]	[30;50]
Très faible	< 600	< 30

Peuplement théorique type B 2 (estimé)

Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
(prenant en compte les données de densité et de biomasse)

Suivi piscicole des têtes de bassin versant du département du Rhône 2015 - Atlas



Le Torranchin à Villecheneve

Code station	TORRA-02	Commune	Villecheneve
Cours d'eau	Torranchin	Localisation	Guillien, aval affleurement roche m
Coordonnées Lambert II de la limite aval	762 906	Objet de la pêche	Sondage
	2 094 858	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	05/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'époussette(s)	2




Caractéristiques de la station

Altitude (m)	520
Distance à la source (km)	4,02
Bassin versant drainé (km²)	10,3
Pente moyenne (‰)	41,2
Longueur (m)	80
Largeur en eau (m)	1,8
Surface de la station (m²)	144
Conductivité (µS/cm)	




Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	100
Epaisseur de la ripisylve	Forêt (>10m) - 2 rives
Ombrage (% de surface)	100
Abris (% de surface)	2,2



Caractéristiques thermiques



Période de suivi	du	01/06/2014	au	15/09/2014
T max jour (°C)		17,5	le	10/08/2014
T max abs (°C)		19,2	à	19:00:00
T max 30 (°C)				17,1
sur la période	du	07/06/2014	au	06/07/2014
T moy 30 (°C)				15,8
sur la période	du	14/06/2014	au	12/08/2014
Nombre d'heures >25°C				0
Amoy30 - Tmax30 (°C)				3,2



Code station : TORRA-02	Cours d'eau : Torranchin	Localisation : Le Guillien, aval affleurement roche mère	Date : 05/06/2015
-------------------------	--------------------------	---	-------------------

Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche


	APP	TRF _a	TRF _i																		Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	11	13	9																		33
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																					
Densités estimées (ind/1000m ³)		113	104																		217
Effectif capturé/estimé (%)		60	60																		60
Biomasses capturées au 1er passage (g)	30	460	4																		494
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																					
Biomasses estimées (kg/ha)		40	0,5																		40
Biomasse capturée/estimée (%)		60	60																		60

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Peuplement théorique type B 2,5 (estimé)


 Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
 (prenant en compte les données de densité et de biomasse)

Note Indice Poissons Rivière (IPR)					19,5
< 7	[7-16]	[16-25]	[25-36]	> 36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (NTE)					3,33
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					3,36
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					4,40
Densité totale d'individus (DTI)					2,55
Densité d'individus tolérants (DIT)					0,61
Densité d'individus invertivores (DII)					2,15
Densité d'individus omnivores (DIO)					1,94


Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	2170	40
Très importante	> 7000	> 300
Importante	[4000;7000]	[200;300]
Assez importante	[2200;4000]	[125;200]
Moyenne	[1200;2200]	[75;125]
Assez faible	[700;1200]	[50;75]
Faible	[400;700]	[30;50]
Très faible	< 400	< 30





La Trambouze à La Ville

Code station	TRAMB-01	Commune	La Ville
Cours d'eau	Trambouze	Localisation	Sous les Bois, 5m amont pont
Coordonnées Lambert II de la limite aval	755 210	Objet de la pêche	Sondage
	2 127 195	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	10/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2

Caractéristiques de la station

Altitude (m)	644
Distance à la source (km)	1
Bassin versant drainé (km²)	1,4
Pente moyenne (‰)	67
Longueur (m)	74
Largeur en eau (m)	0,7
Surface de la station (m²)	49
Conductivité (µS/cm)	63




Caractéristiques d'habitat


Ripisylve (% de linéaire)	0
Épaisseur de la ripisylve	
Ombrage (% de surface)	2
Abris (% de surface)	2,0




Profondeur de la lame d'eau (m)



Substrats




Faciès d'écoulement



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du	01/06/2014	au	15/09/2014
T max jour (°C)		16,7	le	13/06/2014
T max abs (°C)		20,8	à	15:00:00
T max 30 (°C)				18,8
sur la période	du	07/06/2014	au	06/07/2014
T moy 30 (°C)				15,4
sur la période	du	14/06/2014	au	06/07/2014
Nombre d'heures >25°C				0
Amoy30 - Tmax30 (°C)				7,6

Fréquences des classes de températures moyennes journalières sur les 30 jours consécutifs les plus chauds



Code station : TRAMB-01	Cours d'eau : Trambouze	Localisation : Sous les Bois, 5m amont pont jusqu'à la buse	Date : 10/06/2015
--------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	TRF _a	TRF _i																		Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	14	7																		21
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																				
Densités estimées (ind/1000m ²)	354	239																		597
Effectif capturé/estimé (%)	40	60																		72
Biomasses capturées au 1er passage (g)	410	8																		418
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																				
Biomasses estimées (kg/ha)	105	2,7																		108
Biomasse capturée/estimée (%)	40	60																		72


Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche



Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche




Note Indice Poissons Rivière (IPR)					14,8
<= 7	17-161	116-251	251-361	> 361	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (NTE)					1,88
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					2,32
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					3,29
Densité totale d'individus (DTI)					0,91
Densité d'individus tolérants (DIT)					1,71
Densité d'individus invertébrés (DII)					1,52
Densité d'individus omnivores (DIO)					3,18




Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	5972	108
Très importante	> 10000	> 300
Importante	15500;100000	1200;3000
Assez importante	13200;55000	1125;2000
Moyenne	11800;32000	175;1250
Assez faible	1100;18000	150;750
Faible	1600;11000	130;500
Très faible	< 600	< 30

Peuplement théorique type B 1,5 (estimé)

Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
(prenant en compte les données de densité et de biomasse)



La Turdine à Joux

Code station	TURDI-07	Commune	Joux
Cours d'eau	Turdine	Localisation	Amont confluence avec le
Coordonnées Lambert II de la limite aval	757 194	Objet de la pêche	Sondage
	2 100 781	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	05/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2




Caractéristiques de la station

Altitude (m)	517
Distance à la source (km)	3,7
Bassin versant drainé (km ²)	4,8
Pente moyenne (‰)	48,2
Longueur (m)	80
Largeur en eau (m)	1,3
Surface de la station (m ²)	104
Conductivité (µS/cm)	




Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	60
Epaisseur de la ripisylve	ve droite / Cordon (1-5)
Ombrage (% de surface)	60
Abris (% de surface)	2,4



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du	01/06/2015	au	15/09/2015
T max jour (°C)		17,0	le	12/06/2014
T max abs (°C)		19,4	à	17:00:00
T max 30 (°C)				17,0
sur la période	du	07/06/2014	au	06/07/2014
T moy 30 (°C)				15,3
sur la période	du	14/06/2014	au	06/07/2014
Nombre d'heures >25°C				0
Amoy30 - Tmax30 (°C)				4,9




Code station : TURDI-07	Cours d'eau : Turdine	Localisation : Amont confluence avec le Perroquet, depuis fosse du 2nd	Date : 05/06/2015
-------------------------	-----------------------	--	-------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	APP	CHA	TRF _a	TRF _j														Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	14	17	19	15														65
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																		
Densités estimées (ind/1000m ³)		272	228	240														741
Effectif capturé/estimé (%)		60	60	60														60
Biomasses capturées au 1er passage (g)	73	111	520	27														731
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																		
Biomasses estimées (kg/ha)		18	63	4,3														85
Biomasse capturée/estimée (%)		60	60	60														60

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche



Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Peuplement théorique type B 2 (estimé)


Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
(prenant en compte les données de densité et de biomasse)


Note Indice Poissons Rivière (IPR)					7,6
< 7	17-161	116-251	125-361	> 36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (NTE)					1,03
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					0,86
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					1,13
Densité totale d'individus (DTI)					0,28
Densité d'individus tolérants (DIT)					1,11
Densité d'individus invertivores (DII)					0,57
Densité d'individus omnivores (DIO)					2,64



Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	4688	67
Très importante	> 10000	> 300
Importante	]5500;10000]	]200;300]
Assez importante	]3200;5500]	]125;200]
Moyenne	]1800;3200]	]75;125]
Assez faible	]1100;1800]	]50;75]
Faible	]600;1100]	]30;50]
Très faible	< 600	< 30





L'Yzeron aux Adrets

Code station	YZERO-04	Commune	Yzeron
Cours d'eau	Yzeron	Localisation	Les Adrets, 2m amont pont
Coordonnées Lambert II de la limite aval	777 790	Objet de la pêche	Sondage
	2 081 830	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	01/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2




Caractéristiques de la station

Altitude (m)	429
Distance à la source (km)	5,8
Bassin versant drainé (km²)	9,8
Pente moyenne (‰)	38
Longueur (m)	70
Largeur en eau (m)	1,9
Surface de la station (m²)	133
Conductivité (µS/cm)	205




Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	70
Epaisseur de la ripisylve	gordon (1-5m) - 2 rive
Ombrage (% de surface)	80
Abris (% de surface)	3,2



Caractéristiques thermiques



Période de suivi	du	01/06/2014	au	15/09/2014
T max jour (°C)		18,2	le	18/07/2014
T max abs (°C)		20,5	à	20:00:00
T max 30 (°C)				18,0
sur la période	du	14/07/2014	au	12/08/2014
T moy 30 (°C)				16,6
sur la période	du	14/06/2014	au	12/08/2014
Nombre d'heures >25°C				0
Amoy30 - Tmax30 (°C)				4,3




Code station : YZERO-04	Cours d'eau : Yzeron	Localisation : Les Adrets, 2m amont pont jusqu'au milieu de la baraque en	Date : 01/06/2015
-------------------------	----------------------	---	-------------------

Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche


	TRF _a	TRF _i																	Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	55	55																	110
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																			
Densités estimées (ind/1000m ³)	517	649																	1206
Effectif capturé/estimé (%)	88	68																	68
Biomasses capturées au 1er passage (g)	2484	98																	2582
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																			
Biomasses estimées (kg/ha)	233	12																	246
Biomasse capturée/estimée (%)	88	68																	78


Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche


Note Indice Poissons Rivière (IPR)					17,7
<= 7	]7-16]	]16-25]	]25-36]	> 36	
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise	
Scores des métriques de l'IPR					
Nombre total d'espèces (NTE)					4,72
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)					4,37
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)					4,77
Densité totale d'individus (DTI)					1,31
Densité d'individus tolérants (DIT)					0,56
Densité d'individus invertivores (DII)					0,20
Densité d'individus omnivores (DIO)					1,81


Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	12061	246
Très importante	> 10000	> 300
Importante	]5500;10000]	]200;300]
Assez importante	]3200;5500]	]125;200]
Moyenne	]1800;3200]	]75;125]
Assez faible	]1100;1800]	]50;75]
Faible	]600;1100]	]30;50]
Très faible	< 600	< 30

Peuplement théorique type B 2,5 (estimé)
Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
 (prenant en compte les données de densité et de biomasse)




L'Yzeron à Brindas

Code station	YZERO-05	Commune	Brindas
Cours d'eau	Yzeron	Localisation	Chazotier, Amont grand seuil
Coordonnées Lambert II de la limite aval	782 380	Objet de la pêche	Sondage
	2 083 250	Nombre de passage(s)	1
Date de pêche	01/06/2015	Matériel	FEG 1500
Hydrologie	Basses eaux	Nombre d'anode(s)	1
Turbidité	Nulle	Nombre d'épuisette(s)	2

Caractéristiques de la station


Altitude (m)	295
Distance à la source (km)	11,7
Bassin versant drainé (km²)	32,9
Pente moyenne (‰)	20,6
Longueur (m)	64
Largeur en eau (m)	3,9
Surface de la station (m²)	250
Conductivité (µS/cm)	246




Caractéristiques d'habitat

Ripisylve (% de linéaire)	50
Epaisseur de la ripisylve	ordon (1-5m) - 2 rive
Ombrage (% de surface)	50
Abris (% de surface)	0,8


Profondeur de la lame d'eau (m)



Substrats




Faciès d'écoulement



Caractéristiques thermiques

Période de suivi	du 01/06/2014	au 15/09/2014
T max jour (°C)	19,6	le 12/06/2014
T max abs (°C)	21,3	à 20:00:00
T max 30 (°C)		18,7
sur la période	du 07/06/2014	au 06/07/2014
T moy 30 (°C)		17,4
sur la période	du 14/06/2014	au 12/08/2014
Nombre d'heures >25°C		0
Amoy30 - Tmax30 (°C)		3,5




Code station : YZERO-05	Cours d'eau : Yzeron	Localisation : Chazotier, Amont grand seuil	Date : 01/06/2015
-------------------------	----------------------	---	-------------------


Effectifs et biomasses estimés par évaluation de l'efficacité de pêche

	BLN	LOF	TRF _a	TRS	VAI	TRF _j											Total
Effectifs capturés au 1er passage (ind)	7	24	42	1	5	36											115
Effectifs capturés au 2nd passage (ind)																	
Densités estimées (ind/1000m ³)	47	160	210	5	33	240											696
Effectif capturé/estimé (%)	60	60	60	60	60	60											60
Biomasses capturées au 1er passage (g)	37	61	2130	318	18	105											2669
Biomasses capturées au 2nd passage (g)																	
Biomasses estimées (kg/ha)	2,5	4,1	107	16	1,2	7,0											137
Biomasse capturée/estimée (%)	60	60	60	60	60	60											60

Effectifs estimés par évaluation de l'efficacité de pêche




Biomasses estimées par évaluation de l'efficacité de pêche



Note Indice Poissons Rivière (IPR) 12,1

<= 7	17-161	116-251	225-361	> 361
Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Très mauvaise
Scores des métriques de l'IPR				
Nombre total d'espèces (NTE)				1,88
Nombre d'espèces rhéophiles (NER)				2,79
Nombre d'espèces lithophiles (NEL)				3,02
Densité totale d'individus (DTI)				0,29
Densité d'individus tolérants (DTT)				2,73
Densité d'individus invertivores (DII)				0,50
Densité d'individus omnivores (DIO)				0,85

Historique des notes IPR



Classes d'abondance de truite fario (référentiel CSP DR6)

	Densité (ind./ha)	Biomasse (kg/ha)
Observée	4507	114
Très importante	> 7000	> 300
Importante	14000;70000	1200;3000
Assez importante	12200;40000	1125;2000
Moyenne	11200;22000	175;1250
Assez faible	1700;12000	150;750
Faible	1400;7000	130;500
Très faible	< 400	< 30

Peuplement théorique type B 3,5 (estimé)

Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
(prenant en compte les données de densité et de biomasse)