

## L'alimentation des réserves d'eau des établissements ostréicoles exposés au douçain



A few oyster farming businesses of the Marennes-Oléron area are located relatively upstream along estuaries or channels. Depending upon the circumstances and particularly during heavy rains that coincide with neap tides, this situation can make it difficult to supply the reserves with water of suitable salinity and as a result cause the appearance of excessive fresh water in the consignment basins., Quelques établissements ostréicoles de la région « Marennes-Oléron » sont situés relativement en amont sur les estuaires ou chenaux. Selon les circonstances et notamment lors de pluies abondantes coïncidant avec des marées de morte-eau, cette situation peut entraîner un approvisionnement difficile des réserves en eau de salinité convenable et par suite provoquer l'apparition du « douçain » dans les bassins d'expédition.

**Auteurs du document :** Mazieres, Jean

**Obtenir le document :** ISTPM

**Mots clés :** Salinité, Alimentation eau de mer, Ostréiculture, Etablissement ostréicole

**Thème (issu du Text Mining) :** MILIEU NATUREL, TYPOLOGIE DES EAUX, INFORMATION - INFORMATIQUE

**Date :** 1968

**Format :** text/xml

**Source :** Science et Pêche (0036-8350) (ISTPM), 1968 , Vol. 173 , P. 9-14

**Langue :** Inconnu

**Droits d'utilisation :** info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

**Télécharger les documents :** <http://archimer.ifremer.fr/doc/1968/publication-2983.pdf>

<http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/2983/>

**Permalien :** <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/l-alimentation-des-reserves-d-eau-des-etablissements-ostreicoles-exposes-au-doucain0>