

Elevage de palourdes sous filet en milieu fermé



Japanese clam (*Ruditapes philippinarum*) and European clam (*Ruditapes decussatus*) farming based on spat produced in hatcheries has gone beyond the experimental stage on the Atlantic coasts since the research of Latrouite et Claude (1976), Lucas (1977), Flassch (1979), Dréno (1979) and Gras (soon to be published). It has thus become necessary to develop farming procedures reliable enough to be handed over to the professionals in the business., L'élevage de la palourde japonaise *Ruditapes philippinarum* et de la palourde européenne *Ruditapes decussatus* à partir de naissain produit en écloserie a dépassé sur les cotes atlantiques le caractère expérimental depuis les travaux de Latrouite et Claude (1976). Lucas (1977), Flassch (1979), Dréno (1979) et Gras (à paraître). Il est ainsi devenu nécessaire de mettre au point des procédés d'élevage suffisamment fiables pour les transmettre à des professionnels de la mer.

Auteurs du document : Peyre, Roger, Zanette, Yvan, Heral, Maurice

Obtenir le document : ISTPM

Mots clés : Marennes Oléron, *Ruditapes decussatus*, *Ruditapes philippinarum*, Elevage, Palourdes

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, FAUNE, INFORMATION - INFORMATIQUE

Date : 1980

Format : text/xml

Source : Science et Pêche (0036-8350) (ISTPM), 1980 , Vol. 307 , P. 15-18

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <http://archimer.ifremer.fr/doc/1980/publication-3006.pdf>

<http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/3006/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/elevage-de-palourdes-sous-filet-en-mileu-ferme0>