

Le développement de quelques copépodes en méditerranée 1. Les stades jeunes d'Euchaeta Acuta Giesbrecht et d'E. Spinosa Giesbrecht



While the inventory of pelagic copepods of the Mediterranean Sea is currently more or less established, there are very few data on their larval (nauplius) and post-larval (copepodite) developmental stages. However, given their abundance in catches, where their numbers are often greater than those of adults, it is necessary to determine them for any biological study on plankton. Unfortunately, many difficulties arise in the study of these developmental stages. Si l'inventaire des Copépodes pélagiques de la Méditerranée est actuellement établi à peu de choses près, on ne possède encore que très peu de données sur leurs stades de développement larvaire (nauplii) et post-larvaire (copépodites). Pourtant, en raison de l'abondance de ces derniers dans les pêches où leur nombre dépasse souvent celui des adultes, leur détermination est nécessaire pour toute étude biologique du plancton. Leur connaissance se heurte malheureusement à de multiples difficultés. [OCR NON CONTRÔLE]

Auteurs du document : Mazza, Jacques

Obtenir le document : ISTPM

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, MICROORGANISMES NON PATHOGENES - PLANCTON, INFORMATION - INFORMATIQUE

Date : 1964-09

Format : text/xml

Source : Revue des Travaux de l'Institut des Pêches Maritimes (0035-2276) (ISTPM), 1964-09 , Vol. 28 , N. 3 , P. 271-292

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : Ifremer, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <https://archimer.ifremer.fr/doc/1964/publication-4047.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/4047/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/le-developpement-de-quelques-copepodes-en-mediterranee-1-les-stades-jeunes-d-euchaeta-acuta-giesbrec0>