

Sur la présence de composés glucidiques dans le ganglion viscéral de quelques Atlantidés (Gastéropode Prosobranch)



There is in the visceral ganglion of different species of Atlantidae, between the neurons and the neurilemn, a layer of cells containing numerous grains of glycoproteic nature. The development of this cellular layer, more important in females than in males, coincides chronologically with genital maturity. Dans le ganglion viscéral de plusieurs espèces d'Atlantidae, il existe, entre les neurones et le neurilemne, une couche de cellules contenant de nombreux grains de nature probablement glycoprotéique. Le développement de cette couche cellulaire, plus importante chez les femelles que chez les mâles, coïncide chronologiquement avec la maturité génitale. [OCR NON CONTRÔLE]

Auteurs du document : Thiriot-quievreux, Catherine

Obtenir le document : Académie des Sciences

Mots clés : Histoire Ifremer

Thème (issu du Text Mining) : DROIT, MILIEU NATUREL, INFORMATION - INFORMATIQUE

Date : 1971-03

Format : text/xml

Source : Comptes Rendus Académie des Sciences de Paris (Académie des Sciences), 1971-03, Vol. 272, P. 1420-1422

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : Académie des Sciences, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <https://archimer.ifremer.fr/doc/1971/publication-4892.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/4892/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/sur-la-presence-de-composes-glucidiques-dans-le-ganglion-visceral-de-quelques-atlantides-gasteropode0>

Evaluer cette notice: