

Résultats scientifiques de la campagne du N.O "Jean Charcot" en méditerranée occidentale, mai-juin-juillet 1970



The Cumaceans collected during the "Polymède" cruise of the R.V. "Jean Charcot" in the western Mediterranean Sea, come from 12 samplings carried out with an epibenthic drag based on the "epibenthic sled" model by Sanders and Hessler (1967). All these samplings were carried out at depths comprised between 2 000 and 3 000 m (Chardy, Laubier, Reyss and Sibuet, 1971), based on a method developed during a previous cruise (Laubier, Martinais and Reyss, 1971)., Les Cumacés recueillis lors de la campagne "Polymède" du N.O. "Jean Charcot" en Méditerranée occidentale, proviennent de 12 prélèvements effectués à l'aide d'une drague épibenthique construite sur le modèle de l'"epibenthic sled" de Sanders and Hessler (1967). Tous ces prélèvements ont été faits à des profondeurs comprises entre 2000 et 3000 m (Chardy, Laubier, Reyss and Sibuet, 1971) selon une méthode mise au point lors d'une campagne précédente (Laubier, Martinais and Reyss, 1971). [OCR NON CONTRÔLE]

Auteurs du document : Reyss, Daniel

Obtenir le document : Brill Academic Publishers

Mots clés : Histoire Ifremer

Thème (issu du Text Mining) : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PAYSAGE, INDUSTRIE, INFORMATION - INFORMATIQUE

Date : 1972

Format : text/xml

Source : Crustaceana (Brill Academic Publishers), 1972 , N. S3 , P. 362-377

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : Brill Academic Publishers, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <https://archimer.ifremer.fr/doc/1972/publication-4899.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/4899/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/resultats-scientifiques-de-la-campagne-du-n-o-jean-charcot-en-mediterranee-occidentale-mai-juin-juil0>

Evaluer cette notice: