

## Résultats biologiques de la campagne Polymède - II. Le méiobenthos abyssal



Les connaissances actuelles sur les densités en meiobenthos dans les zones bathyale et abyssale sont très limitées [Mc INTYRE, 1969]. Deux séries de résultats concernent le talus continental, entre 200 et 600 m : WIGLEY- MC INTYRE [1964] étudient, sur le plan quantitatif, la méiofaune en deux points situés au large des côtes du Massachussets, par 336 et 567 m de fond. SOYER [1970] indique les valeurs de la densité entre 250 et 550 m de fond sur la côte catalane française. [OCR NON CONTRÔLE]

**Auteurs du document :** Dinet, A., Laubier, Lucien, Vitiello, P.

**Mots clés :** Histoire Ifremer

**Thème (issu du Text Mining) :** MILIEU NATUREL, INDUSTRIE, SCIENCES EXACTES SCIENCES HUMAINES, INFORMATION - INFORMATIQUE

**Date :** 1973

**Format :** text/xml

**Source :** Rapp. Comm. Int. Explor. Sci. Mer Mediterr., Monaco, 1973 , Vol. 21 , N. 9 , P. 701-704

**Langue :** Inconnu

**Droits d'utilisation :** info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

**Télécharger les documents :** <https://archimer.ifremer.fr/doc/1973/publication-5024.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/5024/>

**Permalien :** <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/resultats-biologiques-de-la-campagne-polymede-ii-le-meibenthos-abysal0>