Eau & Biodiversité
Portail documentaire partenarial

Document généré le 04/07/2025 depuis l'adresse https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/histoire-tectonique-du-golfe-de-gascogne0.

Histoire tectonique du golfe de gascogne

Il y a environ 200 m. a. (millions d'années), le golfe de Gascogne n'existait pas ; les rebords des plateaux continentaux du nord de la péninsule ibérique et de l'Europe étaient jointifs. Bien que des cassures se soient produites dès la fin du Trias (200 m. a.), le mouvement d'ouverture du golfe de Gascogne aurait commencé dès la fin du Jurassique (136 m. a.) pour se terminer au Crétacé supérieur (80 m. a.). La péninsule ibérique aurait subi, par rapport à l'Europe, une rotation d'environ 23 degrés autour d'un pôle situé près de Paris. Du Crétacé supérieur à l'Eocène supérieur (38 m. a.) un mouvement de compression d'une cinquantaine de km d'amplitude, entre la péninsule ibérique et l'Europe stable, serait responsable de la formation des Pyrénées et d'un fossé situé au pied de la marge continentale nord-espagnole. [OCR NON CONTRÔLE]

Auteurs du document : Sibuet, Jean-claude
Obtenir le document : Centre Océanologique de Bretagne
Mots clés : Histoire Ifremer
Thème (issu du Text Mining) : GEOLOGIE, INFORMATION - INFORMATIQUE
Date : 1974
Format : text/xml
Source : Journal title unknown (Centre Océanologique de Bretagne), 1974 , P. 297-312
Langue : Inconnu
Droits d'utilisation : Centre Océanologique de Bretagne, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use
Télécharger les documents : https://archimer.ifremer.fr/doc/1974/publication-5134.pdf
https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/5134/
Permalien : https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/histoire-tectonique-du-golfe-de-gascogne0

Evaluer cette notice:

Office International de l'Eau

Ce portail, créé et géré par l'Office International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l'Office français de la biodiversité (OFB)

OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ