

Contribution à l'étude des cumacé de profondeur en atlantique : le genre Diastylodes Sars, 1900



Genus Diastylodes Sars, 1900, is characterized by a mandible which is truncated at its base (type Leuconidae) that it is the only one to possess in the Diastylidae family. Known to this day by 5 species, its distribution area seems to be limited to the northern Atlantic Ocean, from Norway to the Mediterranean Sea. The study of the material collected during more recent cruises enabled us to extend this distribution area and lead to the description of two new species., Le genre Diastylodes Sars, 1900, est caractérisé par une mandibule tronquée à la base (du type Leuconidae) qu'il est le seul à posséder au sein de la famille des Diastylidae. Connue à ce jour par 5 espèces, son aire de répartition semblait limitée à l'Atlantique Nord, de la Norvège à la Méditerranée. L'étude du matériel provenant de campagnes récentes permet d'étendre cette aire de répartition et conduit à décrire deux espèces nouvelles. [OCR NON CONTRÔLÉ]

Auteurs du document : Reyss, Daniel

Obtenir le document : Centre Océanologique de Bretagne

Mots clés : Histoire Ifremer

Thème (issu du Text Mining) : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PAYSAGE, INFORMATION - INFORMATIQUE, MILIEU NATUREL

Date : 1973

Format : text/xml

Source : Journal title unknown (Centre Océanologique de Bretagne), 1973 , P. 343-351

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : Centre Océanologique de Bretagne, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <https://archimer.ifremer.fr/doc/1973/publication-5137.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/5137/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/contribution-a-l-etude-des-cumace-de-profondeur-en-atlantique-le-genre-diastyloides-sars-19000>

Evaluer cette notice: