

Contribution à la connaissance de la biologie du rouget-barbet en atlantique-nord (IV) - Mullus barbatus (rond) surmuletus (fage)



In this fourth contribution to the understanding of the biology of the goatfish (cf. Desbrosses, 18-23-34), we decided to study the morphological characters of the North Atlantic population. [...], Nous nous proposons dans cette quatrième contribution à la connaissance de la biologie du Rouget-Barbet (c.f. DESBROSSES, 18-23-24) d'examiner les caractères morphologiques de la population fréquentant l'Atlantique Nord. Ces caractères sont de deux sortes : numériques (ou méristiques), en ce qu'ils correspondent au dénombrement des rayons des nageoires, des rangées d'écaillés, et des vertèbres ; et métriques (ou plastiques) en ce qu'ils s'appuient sur des mensurations et traduisent les proportions du corps. [OCR NON CONTRÔLE]

Auteurs du document : Desbrosses, Pierre

Obtenir le document : ISTPM

Mots clés : Histoire Ifremer

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, SCIENCES EXACTES SCIENCES HUMAINES, INFORMATION - INFORMATIQUE

Date : 1936-12

Format : text/xml

Source : Revue des Travaux de l'Institut des Pêches Maritimes (0035-2276) (ISTPM), 1936-12 , Vol. 9 , N. 4 , P. 339-399

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : Ifremer, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <https://archimer.ifremer.fr/doc/1936/publication-5752.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/5752/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/contribution-a-la-connaissance-de-la-biologie-du-rouget-barbet-en-atlantique-nord-iv-mullus-barbatus0>