

Statistiques biologiques et considérations sur la population harengière du klondyke et du nord de l'Irlande



En 1926, nous avons signalé à l'Armement français (1), l'existence, dans le Nord de l'Irlande, à 30 ou 40 milles dans le Nord-Nord-Ouest du phare d'Inishtrahull, d'une forte pêcherie de harengs de chalut pendant les mois d'été et les premiers mois de l'automne. Dès les premiers jours de l'été 1927, quelques chalutiers boulonnais se rendirent dans cette région dite encore " KLONDYKES Irlandais » et les bons résultats obtenus les engagèrent à y retourner. Depuis cette date, la pêcherie de harengs des Klondykes est activement suivie par les chalutiers boulonnais qui apparaissent dans cette région vers la fin de la première quinzaine de juillet et y chalutent régulièrement le hareng jusqu'à la mi-novembre. Ils capturent également, dans ces mêmes parages, de très grandes quantités de maquereaux et ramènent fréquemment d'abondantes pêches de gros poissons particulièrement de colins noirs ou *Gadus virens*. [OCR NON CONTRÔLE]

Auteurs du document : Le Gall, Jean

Obtenir le document : ISTPM

Mots clés : Histoire Ifremer

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, SCIENCES EXACTES SCIENCES HUMAINES, INFORMATION - INFORMATIQUE

Date : 1932-06

Format : text/xml

Source : Revue des Travaux de l'Institut des Pêches Maritimes (0035-2276) (ISTPM), 1932-06 , Vol. 5 , N. 2 , P. 123-139

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : Ifremer, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <https://archimer.ifremer.fr/doc/1932/publication-5825.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/5825/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/statistiques-biologiques-et-considerations-sur-la-population-harenguiere-du-klondyke-et-du-nord-de-l0>

Evaluer cette notice: