

Quelques observations sur l'absence de "verdeur" dans la région de mareennes (décembre 1930)



Le processus du verdissement des huîtres est, sans doute, un des problèmes ostréicoles les plus discutés jusqu'à ce jour. La question n'a cependant guère avancé, au point de vue pratique, depuis un siècle : les huîtres sont placées dans les claires qui verdissent ou ne verdissent pas, sans qu'on ne puisse en rien le prévoir. La grande majorité des claires ont "boudé" - suivant l'expression du pays - cet hiver, et les ostréiculteurs mareennais se sont trouvés dans l'impossibilité de satisfaire, au moins pour la couleur, leur clientèle française qui exige de plus en plus impérieusement des mareennes vertes. On conçoit facilement leur préoccupation devant cette situation, d'où il peut résulter pour eux un gros dommage. [OCR NON CONTRÔLÉ]

Auteurs du document : Voisin, P

Obtenir le document : ISTPM

Mots clés : Histoire Ifremer

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, INFORMATION - INFORMATIQUE, ENVIRONNEMENT

Date : 1931-06

Format : text/xml

Source : Revue des Travaux de l'Institut des Pêches Maritimes (0035-2276) (ISTPM), 1931-06 , Vol. 4 , N. 2 , P. 223-230

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : Ifremer, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <https://archimer.ifremer.fr/doc/1931/publication-5886.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/5886/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/quelques-observations-sur-l-absence-de-verdeur-dans-la-region-de-mareennes-decembre-19300>