

Etude du cycle de *Marteilia refringens* dans l'Etang de Thau



Since the beginning of the epizooty of the flat oyster *Ostrea edulis* on the Atlantic coast (Comps, 1970), it has been observed that the parasitosis did not develop in the Mediterranean Sea in oysters from the Thau lagoon even though a large part of the culture is made up of young oysters from Brittany. However, some episodic studies only rarely found the presence of *Marteilia refringens* in the oysters from the lagoon. Depuis le début de l'épizootie de l'huître plate *Ostrea edulis* sur la Côte Atlantique (COMPS, 1970), il a été constaté que la parasitose ne se développait pas en Méditerranée chez les huîtres de l'Etang de Thau, bien qu'une partie importante de la culture soit faite à partir de jeunes huîtres provenant de Bretagne. Des examens épisodiques néanmoins ont permis de déceler très rarement la présence de *Marteilia refringens* chez des huîtres de l'étang.

Auteurs du document : Comps, Michel

Obtenir le document : Actes CIEM, CM 1979/F : 19

Mots clés : *Marteilia refringens*, *Ostrea edulis*, Pathologie, Parasite

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, SCIENCES EXACTES SCIENCES HUMAINES, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PAYSAGE, INFORMATION - INFORMATIQUE

Date : 1979

Format : text/xml

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <https://archimer.ifremer.fr/doc/1979/acte-6078.PDF>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/6078/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/etude-du-cycle-de-marteilia-refringens-dans-l-etang-de-thau0>

Evaluer cette notice: