

Quelques observations sur la fréquence de *Mytilicola intestinalis steuer* (Copepoda parasita) dans les moules du littoral méditerranéen français



La prospérité de la mytiliculture zélandaise a été interrompue brusquement en 1950 par l'action du Copépode parasite *Mytilicola intestinalis* Steuer. Le *Mytilicola* est dit en France le "Cop Rouge". [OCR NON CONTRÔLÉ]

Auteurs du document : Korringa, P, Lambert, L

Obtenir le document : ISTPM

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, FAUNE, INFORMATION - INFORMATIQUE

Date : 1951-03

Format : text/xml

Source : Revue des Travaux de l'Institut des Pêches Maritimes (0035-2276) (ISTPM), 1951-03 , Vol. 17 , N. 65 , P.

15-29

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : Ifremer, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <https://archimer.ifremer.fr/doc/1951/publication-6748.pdf>
<https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/6748/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/quelques-observations-sur-la-frequence-de-mytilicola-intestinalis-steuer-copepoda-parasita-dans-les-0>

Evaluer cette notice: