

Expédition antarctique française (1903-1905) commandée par le Dr Jean Charcot. Vers et brachiopodes



La collection de Némertiens de l'Expédition antarctique française commandée par le Dr Charcot ne comprend pas un grand nombre d'espèces ; mais plusieurs d'entre elles sont représentées par un grand nombre d'échantillons, ce qui permet de se rendre compte de la répartition de ces êtres au point de vue de la composition de la faune. Toutes ces Némertes ont été recueillies sur le rivage, sous le sable, sous les pierres, ou draguées à faible profondeur, dont le maximum est 40 mètres, ou prises à la ligne dans les mêmes localités. Ce sont donc des représentants exclusifs de la faune littorale formant une série bien différente des espèces recueillies par la " Belgica ", qui sont des Némertes de grandes profondeurs et dont le nombre des individus récoltés est bien plus restreint. [OCR NON CONTRÔLE]

Auteurs du document : Joubin, L., Herubel, M.a., Oehlert, D.p.

Mots clés : Brachiopodes, Vers, Antarctique, Expédition, Campagne, Histoire

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, INDUSTRIE, FAUNE, INFORMATION - INFORMATIQUE

Date : 1908

Format : text/xml

Source : Expédition antarctique française (1903-1905) commandée par le Dr Jean Charcot

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : 1908 Masson, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <https://archimer.ifremer.fr/doc/1908/publication-6961.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/6961/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/expedition-antarctique-francaise-1903-1905-commandee-par-le-dr-jean-charcot-vers-et-brachiopodes0>

Evaluer cette notice: