

Expédition antarctique française (1903-1905) commandée par le Dr Jean Charcot. Hexactinides et Bryozoaires



Les Actiniaires de la région sub-antarctique sont assez bien connus ; les publications de Carlgren (1898, 1903), celles de Playfair Mac Murrich (1893, 1905), pour choisir les plus complètes, donnent à leur sujet des renseignements circonstanciés. Il n'en est plus de même à l'égard de la région antarctique proprement dite, au-dedans des limites d'extension de la banquise. Ici, les documents sont moins nombreux, soit qu'ils manquent vraiment, soit qu'ils n'aient pas encore été publiés. La collection rapportée par l'Expédition Charcot mérite donc un examen attentif. [OCR NON CONTRÔLE]

Auteurs du document : Roule, Louis, Calvet, Louis

Mots clés : Bryozoaires, Hexactinides, Antarctique, Expédition, Campagne, Histoire

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, INFORMATION - INFORMATIQUE

Date : 1908

Format : text/xml

Source : Expédition antarctique française (1903-1905) commandée par le Dr Jean Charcot

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : 1908 Masson, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <https://archimer.ifremer.fr/doc/1908/publication-6963.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/6963/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/expedition-antarctique-francaise-1903-1905-commandee-par-le-dr-jean-charcot-hexactinides-et-bryozoai0>