

Situation épidémiologique consécutive à la présence du parasite *Bonamia Ostreae* en Bretagne - Evolution au cours de l'année 1980



Au mois de juin 1979, des mortalités anormales affectant l'huître plate, *Ostrea edulis* L., ont été constatées sur des parcs d'élevage de l'île Tudy en Bretagne, (Comps et coll., 1980). Les examens histologiques ont permis de déceler l'existence, dans les cellules sanguines des huîtres atteintes, d'un nouveau parasite, *Bonamia ostreae* gen., n., sp. n. (Pichot et coll., 1979). Depuis, l'extension de cette parasitose a été constatée par l'analyse mensuelle d'échantillons d'huîtres provenant de différents secteurs ostréicoles de Bretagne. La présente note donne des précisions sur la situation épidémiologique et sur son évolution au cours de l'année 1980 à la suite du développement de ce nouveau parasite.

Auteurs du document : Tige, Gilbert, Grizel, Henri, Martin, Anne-geneviève, Langlade, Aimé, Rabouin, Marie-agnès
Obtenir le document : ISTPM

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, SCIENCES EXACTES SCIENCES HUMAINES

Date : 1981-07

Format : text/xml

Source : Science et Pêche (0036-8350) (ISTPM), 1981-07 , Vol. 315 , P. 13-20

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : Ifremer, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <https://archimer.ifremer.fr/doc/1981/publication-7018.pdf>
<https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/7018/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/situation-epidemiologique-consecutive-a-la-presence-du-parasite-bonamia-ostreae-en-bretagne-evolutio0>

Evaluer cette notice: