

La crépidule (*crepidula fornicata* L.) en France



L'introduction de *Crepidula fornicata* L. en Europe remonte à la fin du siècle dernier mais son implantation en France ne date que d'une vingtaine d'années. On découvre chaque année sa présence dans de nouvelles régions productrices de mollusques comestibles, tandis que l'on constate une augmentation progressive des populations de ce gastéropode dans les secteurs les plus anciennement colonisés. Il nous paraît donc opportun de rappeler aux conchyliculteurs et aux pêcheurs son mode de vie, et de leur faire connaître sa distribution actuelle sur nos côtes avant d'attirer, une fois encore, leur attention sur la nécessité de la combattre.

Auteurs du document : Marteil, Louis

Obtenir le document : ISTPM

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, FAUNE, INFORMATION - INFORMATIQUE

Date : 1963-12

Format : text/xml

Source : Science et Pêche (0036-8350) (ISTPM), 1963-12 , Vol. 121 , P. 1-6

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : Ifremer, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <https://archimer.ifremer.fr/doc/1963/publication-7044.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/7044/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/la-crepidule-crepidula-fornicata-l-en-france0>