

Le diapirisme dans le bassin liguro-provençal (Méditerranée Occidentale)



En Méditerranée occidentale, le Bassin liguro-provençal constitue le bassin le plus important. Son ouverture est en relation avec la dérive de la Corse-Sardaigne, dans un contexte caractérisé par la convergence des plaques Afrique et Europe. Le remplissage de ce bassin se caractérise par la présence d'une série évaporitique déposée lors d'un épisode de dessiccation généralisée au Messinien (Miocène supérieur). Cette série, surmontée par des dépôts plio-quaternaires, est à l'origine de phénomènes d'halocinèse engendrant l'ascension de diapirs qui déforment les terrains sus-jacents.

Auteurs du document : Le Cann, Chantal

Obtenir le document : Université de Bretagne Occidentale

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, SCIENCES EXACTES SCIENCES HUMAINES

Date : 1987-05-14

Format : text/xml

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : UBO, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <https://archimer.ifremer.fr/doc/00034/14519/11835.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00034/14519/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/le-diapirisme-dans-le-bassin-liguro-provençal-mediterranee-occidentale0>

Evaluer cette notice: