

## Evolution des zones humides littorales en Bretagne



Les images évoquant le littoral breton sont bien souvent celles de falaises en avant desquelles émergent une multitude de récifs ou d'îlots rocheux. Pourtant entre les secteurs de côte rocheuse s'étendent des terres basses, situées pour la plupart au-dessous du niveau des plus hautes marées. Leurs limites demeurent souvent fort indécises et présentent en outre une grande instabilité du fait de l'érosion, de la sédimentation, des oscillations du niveau marin et des mouvements tectoniques qui les déplacent continuellement.

**Auteurs du document :** Hallégouët, Bernard, Poncet, Florence

**Thème (issu du Text Mining) :** MILIEU NATUREL, MOT OUTIL

**Date :** 1980

**Format :** text/xml

**Langue :** Inconnu

**Droits d'utilisation :** info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

**Télécharger les documents :** <https://archimer.ifremer.fr/doc/00082/19337/16931.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00082/19337/17006.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00082/19337/17007.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00082/19337/17008.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00082/19337/17009.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00082/19337/17010.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00082/19337/17011.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00082/19337/>

**Permalien :** <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/evolution-des-zones-humides-littorales-en-bretagne0>