

Prédation de la palourde japonaise *Ruditapes philippinarum* par le baliste *Balistes capricus*



1988 s'avérait être, pour le bassin d'Arcachon, l'année d'un réel départ de l'élevage de la palourde Japonaise *Ruditapes philippinarum*. Cinq millions de naissains étaient ainsiensemencés, principalement au printemps, soit 4 à 5 fois plus que les années antérieures. La récolte théorique aurait dû avoisiner 50 tonnes en 1990, soit 1/10 de la production nationale . Or d'importantes mortalités étaient signalées au cours de l'été 1988, 80% environ du cheptelensemencé ayant été touché.

Auteurs du document : Robert, Rene, Artiguenave, F., Parra, M.

Obtenir le document : Société Française de Malacologie

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, FAUNE

Date : 1990

Format : text/xml

Source : Haliotis (0397-765X) (Société Française de Malacologie), 1990 , Vol. 10 , P. 191-193

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : 1990 Société Française de Malacologie, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <https://archimer.ifremer.fr/doc/00090/20161/17814.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00090/20161/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/predation-de-la-palourde-japonaise-ruditapes-philippinarum-par-le-baliste-balistes-capricus0>