

Estimation de la teneur en acétate de tributyle étain dans l'eau de mer, par une méthode biologique



L'acétate de tributyle-étain, composé actif de certaines peintures antisalissures, représente un danger certain pour les zones conchylicoles de captage (E. HIS et R. ROBERT, 1980 et R. ROBERT et E. HIS, 1981). Les méthodes chimiques actuelles ne sont pas assez sensibles pour permettre le dosage de ce produit dans l'eau de mer, au seuil de toxicité pour les larves d'huîtres. Une échelle d'action pour douze concentrations comprises entre 100 ug/l. et 0,02 ug/l., sur les véligères de *Crassostrea gigas* est proposée. Elle permet d'évaluer le degré de contamination de l'eau de mer d'un port de plaisance et son évolution.

Auteurs du document : His, Edouard, Maurer, Daniele, Robert, Rene

Obtenir le document : British symposium on molluscs, 1983, 9 p.

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, POLLUANTS

Date : 1983

Format : text/xml

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : ISTM, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <https://archimer.ifremer.fr/doc/00090/20162/17815.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00090/20162/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/estimation-de-la-teneur-en-acetate-de-tributyle-etain-dans-l-eau-de-mer-par-une-methode-biologique0>

Evaluer cette notice: