

L'ostréiculture sur la côte Est du Cotentin



Une approche socio-économique a permis de classer en 5 catégories les exploitations conchylicoles de la côte est du Cotentin. Parallèlement, une stratégie d'échantillonnage a été mise au point dans cette zone. Dans chacune des 20 strates, la densité des poches et la composition du stock (naissain, 18 mois, ...) ont été évaluées, ce qui a permis d'estimer à 12 900 tonnes le stock d'huîtres en élevage en 1989 et 1990.

Auteurs du document : Jeanneret, Hélène, Kopp, Joel, Joly, Jean-pierre, Moriceau, Jacques, Legagneur, Eric

Mots clés : Ostréiculture, Stocks, Crassostrea gigas, Est Cotentin, Exploitations conchylicoles, Echantillonnage

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL

Date : 1992-09

Format : text/xml

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : 1992 Ifremer, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <https://archimer.ifremer.fr/doc/00092/20361/18022.pdf>

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00092/20361/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/l-ostreiculture-sur-la-cote-est-du-cotentin0>

Evaluer cette notice: