

L'ostréiculture sur la côte Est du Cotentin



Une approche socio-économique a permis de classer en 5 catégories les exploitations conchylicoles de la côte est du Cotentin. Parallèlement, une stratégie d'échantillonnage a été mise au point dans cette zone. Dans chacune des 20 strates, la densité des poches et la composition du stock (naissain , 18 mois, ...) ont été évaluées, ce qui a permis d'estimer à 12 900 tonnes le stock d'huîtres en élevage en 1989 et 1990.

Auteurs du document : Jeanneret, Hélène, Kopp, Joel, Joly, Jean-pierre, Moriceau, Jacques, Legagneur, Eric Mots clés : Ostréiculture, Stocks, Crassostrea gigas, Est Cotentin, Exploitations conchylicoles, Echantillonnage Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL

Date: 1992-09

Format: text/xml

Langue: Inconnu

Droits d'utilisation: 1992 Ifremer, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : https://archimer.ifremer.fr/doc/00092/20361/18022.pdf

https://archimer.ifremer.fr/doc/00092/20361/

Permalien: https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/l-ostreiculture-sur-la-cote-est-du-cotentin0

Evaluer cette notice:



Ce portail, créé et géré par l'Office International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l'Office français de la biodiversité (OFB)

