

Eléments sur la croissance de la crevette grise, Crangon crangon (L.), en Manche-Est et en Sud mer du Nord.



From a very important data basis collected from 1977 to 1982, an approach of growth with the Petersen method is realised. A sex discrimination has been done, and females are studied more precisely according to the hypothesis of heterosexuality (HASSELBLAD method). The demographic structures between the two areas are compared., A partir d'une base de données très importantes de mensurations acquises de 1977 à 1982, une approche de la croissance suivant la méthode de Petersen est abordée. Une discrimination des sexes a été réalisée et, selon l'hypothèse d'un gonochorisme, ce sont les femelles qui sont l'objet d'une étude plus précise (méthode d'HASSELBALD). Les structures démographiques entre les deux secteurs étudiés sont comparées.

Auteurs du document : Tetard, Alain

Obtenir le document : Conseil International pour l'Exploration de la Mer (CIEM)

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, FAUNE

Date : 1985

Format : text/xml

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : 1985 CIEM, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use

Télécharger les documents : <https://archimer.ifremer.fr/doc/00247/35862/34383.pdf>
<https://archimer.ifremer.fr/doc/00247/35862/>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/elements-sur-la-croissance-de-la-crevette-grise-crangon-crangon-l-en-manche-est-et-en-sud-mer-du-nor0>

Evaluer cette notice: