

Conséquences des modes de gestion conservatoire (pâturage équin et bovin, pâturage mixte, fauche et débroussaillage) sur la dynamique des communautés végétales de la Réserve Naturelle du Marais de Lavours (Ain, France ; bilan de 1987 à 1996)

Sur la réserve naturelle du Marais de Lavours (classé en 1984), une expérimentation de gestion par pâturage a été menée sur 2 sites en 1987 (12 bovins Highland cattle) et 1989 (9 chevaux Camargue), avec l'objectif d'étudier les impacts du pastoralisme sur la dynamique de végétation. Un premier bilan a été effectué en 1992 pour la période 1987-1991. Le présent rapport correspond au bilan de la période 1991-1996. La première partie est consacrée à l'origine et à la mise en place du pastoralisme dans ce marais : aperçu historique, protocole de suivi et résultats. La deuxième partie décrit les nouvelles caractéristiques de la gestion, à savoir l'alternance fauche-débroussaillage-pâturage mixte. La troisième partie évoque les perspectives pour la gestion de la réserve et la recherche.

Auteurs du document : BEFFY, J-L., MAJCHRZAK, Yves, MORAND, Alain, MANNEVILLE, Olivier, DARINOT, Fabrice

Obtenir le document : DIREN Rhône-Alpes

Mots clés : marais de Lavours, Ain (01), Rhône-Alpes, Gestion éco-pastorale, Fauche, Débroussaillage, Réserve naturelle, Marais, réserve naturelle, gestion conservatoire, dynamique de végétation, groupements végétaux, pâturage, fauche, débroussaillage, bovins, équins

Date : 1998

Type de ressource : Livre

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : FCEN11577

Langue : Français

Accéder à la notice source : <https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&alold=11577>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/consequences-des-modes-de-gestion-conservatoire-paturage-equin-et-bovin-paturage-mixte-fauche-et-deb0>

Evaluer cette notice: