

Les champignons des tourbières des Hautes-Vosges face à la canicule de l'été 2003

L'auteur restitue ses observations de la flore fongique en tourbières pendant la canicule de l'été 2003, exceptionnelle surtout par sa durée. Dans les Vosges, seules les tourbières d'altitude (depuis le col du Bonhomme jusqu'au Ballon d'Alsace) ont permis d'accueillir quelques espèces. Ces tourbières étaient soit protégées par un couvert ligneux dense (et bien alimentées en eau de source ou de ruissellement), ou avaient pu garder un plan d'eau suffisamment important. L'auteur liste ainsi les champignons qui ont " bravé la canicule " (de rares poussées, des genres parfois bien représentés, des fructifications d'espèces rares), et " les grands absents ", notamment les espèces sphagnicoles emblématiques des tourbières. Ces remarques seront bien sûr à compléter et affiner par d'autres investigations avant de dégager des généralités valables pour d'autres tourbières.

Auteurs du document : DOLL, Daniel

Diffuseur des métadonnées : FEDERATION DES CONSERVATOIRES D'ESPACES NATURELS

Mots clés : Champignons, tourbières, météorologie

Type de ressource : Article

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : FCEN7822

Langue : Français

Accéder à la notice source : <https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloid=7822>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/les-champignons-des-tourbieres-des-hautes-vosges-face-a-la-canicule-de-l-ete-20030>

Evaluer cette notice: