

Reedbed monitoring using classification trees and SPOT-5 seasonal time series



Evaluation des densités et du développement de roselières en Camargue par télédétection satellitaire. Les arbres de classification appliqués à une série d'images SPOT-5 apparaissent comme un outil fiable et puissant pour assurer le suivi de la végétation des zones humides. La précision et la fiabilité des modèles utilisés fournissent une vision où les rôles sont inversés : les campagnes de terrain deviennent un outil complémentaire au suivi des zones humides par télédétection satellitaire.

Auteurs du document : LEFEBVRE G., DAVRANCHE A., POULIN B.

Obtenir le document : Technische Universität Dresden

Mots clés : CAMARGUE, ROSELIERE, SIG, TELEDETECTION

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL

Date : 2011

Type de ressource : Acte / Compte-rendu

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : PRLM6703

Langue : Anglais

Accéder à la notice source : <http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=alo&alold=6703>

Télécharger les documents :

<http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/digidoc.seam?>

[actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless&statelessToken=dSNeQTMABKV7IoHPDfG0IbvZ6W3tjoJ8ZysjdLQ7xQs](http://85.31.222.100/alexandrie-7/dyn/portal/digidoc.seam?actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless&statelessToken=dSNeQTMABKV7IoHPDfG0IbvZ6W3tjoJ8ZysjdLQ7xQs)

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/reedbed-monitoring-using-classification-trees-and-spot-5-seasonal-time-series0>

Evaluer cette notice: