

Caractéristiques générales des populations de saumon atlantique (*Salmo salar* L.) des rivières du Massif Armoricain



Les populations naturelles de Saumon atlantique (*Salmo salar*) des rivières du Massif Armoricain ont été étudiées de 1971 à 1984 en caractérisant les phases juvéniles (stades parr et smolt) et adulte. Cet article synthétise l'ensemble des connaissances biologiques acquises sur cette espèce dans cette région durant cette période., Wild populations of Atlantic salmon in the rivers of the Armorican Massif were studied between 1971 and 1984.

Auteurs du document : Baglinière, Jean-Luc, Prouzet, P., Porcher, J.P., Nihouarn, A., Maisse, Gérard

Obtenir le document : INRA

Mots clés : poisson, salmonidae, saumon de l'atlantique, salmo salar, juvénile, migration, france, bretagne, massif armoricain, rivière, rivière du scorff, restauration des populations, densité de population, flux migratoire

Date : 1987

Format : text/xml

Source : La restauration des rivières à saumons.1987, 23-37

Langue : Inconnu

Droits d'utilisation : <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

Télécharger les documents : <http://prodinra.inra.fr/ft/273DAFF6-5896-4FD6-AC26-08436CE535B3>
<http://prodinra.inra.fr/record/409389>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/caracteristiques-generales-des-populations-de-saumon-atlantique-salmo-salar-l-des-rivieres-du-massif0>

Evaluer cette notice: