

Lamproie de Planer. *Lampetra planeri* (Bloch, 1784)



La Lamproie de Planer fréquente ruisseaux et cours d'eau de plaines, de piedmonts et de montagnes, propres et bien oxygénés. La présence d'un substrat relativement fin (sable, gravier) semble aussi être important pour la confection du nid ainsi que pour le nourrissage et le déplacement des larves, appelées ammocètes (ces dernières restent enfouies dans les sédiments pendant toute la durée de leur vie larvaire). La température de l'eau joue un rôle important lors de la reproduction, et doit être comprise entre 8 et 11°C.

Auteurs du document : PUISSAUVE R., LEGROS B., ONEMA, MNHN

Obtenir le document : [ONEMA](#)

Diffuseur des métadonnées : ONEMA

Mots clés : REGLEMENTATION, CARTE DE REPARTITION, HABITATS, CYCLE DE VIE, METHODE DE

DETECTION, ESPECE PROTEGEE, PEDAGOGIE, LAMPROIE

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, FAUNE

Date : 2015-07-01

Type de ressource : Fiche technique

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : 2015.089

Source : Fiche Espèce protégée. 4p.

Langue : Français

Droits d'utilisation : Accès libre

Couverture géographique :

National

Télécharger les documents : http://oai.afbiodiversite.fr/cindocoai/download/PUBLI/796/1/2015_089.pdf_3269Ko

Emprise nationale : FXX

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/lamproie-de-planer-lampetra-planeri-bloch-17840>

Evaluer cette notice: