

## Pratiques de repeuplements en région méditerranéenne française : cas du bassin de l'Orb (Hérault)

---

Depuis la fin du siècle dernier, afin de contrôler l'abondance des populations de truites communes (*Salmo trutta* L.), des pratiques de repeuplements se sont mises en place de façon plus ou moins généralisée. Les repeuplements pratiqués en région méditerranéenne entre 1984 et 1987 ont été analysés à partir des procès-verbaux de repeuplements des Associations pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques. La truite commune (*Salmo trutta fario* L.) représente la plus grande part des déversements. En l'absence de documents synthétiques, un bilan historique (de 1966 à 1989) des pratiques de repeuplements en truites communes a été réalisé dans le département de l'Hérault et à l'échelle du bassin de l'Orb. Bien que généralisées, les pratiques varient suivant les lieux et les gestionnaires.

**Auteurs du document** : D. BEAUDOU, A. DE ROBERT, P. BERREBI

**Obtenir le document** : EDP Sciences

**Mots clés** : brown trout, salmo trutta fario, stocking practices, truite commune, salmo trutta fario, repeuplements

**Date** : 2008-08-01

**Format** : text/xml

**Source** : <https://doi.org/10.1051/kmae:1994033>

**Langue** : Français

**Télécharger les documents** : <http://www.kmae-journal.org/10.1051/kmae:1994033/pdf>

**Permalien** : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/pratiques-de-repeuplements-en-region-mediterraneenne-francaise-cas-du-bassin-de-l-orb-herault0>