

L'utilisation de naissain d'ecloserie, en particulier triploïde, en ostréiculture : analyse des conséquences sanitaires, environnementales, génétiques et Zootechniques



Au cours de l'été 2008, d'importantes mortalités d'huîtres, en particulier de juvéniles, ont été observées dans la quasi-totalité des zones conchylicoles françaises. Ce rapport examine dans une première partie les causes possibles de ces mortalités. La seconde partie du rapport examine les données disponibles sur la fertilité des triploïdes et les résultats des opérations de biovigilance. La troisième partie présente les données disponibles sur l'écophysiologie des 3n.

Auteurs du document : Boeuf G., Bonhomme F., Chevassus-au-Louis B., Mathieu M.

Diffuseur des métadonnées : Office International de l'Eau

Mots clés : CONCHYLICULTURE, OSTREICULTURE, QUALITE DE L'EAU

Date : 2009-05-15

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : OIE/32525

Source : Page 56 p.

Langue : Français

Accéder à la notice source :

<https://www.oieau.fr/eaudoc/notice/Lutilisation-de-naissain-decloserie-en-particulier-triploide-en-ostreiculture-analyse-des>

Télécharger les documents : https://www.oieau.fr/eaudoc/system/files/documents/44/224018/224018_doc.pdf

Emprise nationale : FXX

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/l-utilisation-de-naissain-d-ecloserie-en-particulier-triploide-en-ostreiculture-analyse-des-conseque0>

Evaluer cette notice: