

Sterne naine. *Sternula albifrons* (Pallas, 1764)



Au cours de la période de nidification, les oiseaux côtiers fréquentent principalement les plages tranquilles, les zones portuaires, les lagunes côtières, les marais salants, secondairement les îles sablonneuses et en Méditerranéen, les plages, dunes ainsi que les arrières-dunes. A l'intérieur des terres, ce sont les îles des fleuves que la Sterne naine affectionne, mais parfois aussi les îlots de milieux artificiels comme les gravières.

Auteurs du document : LEGROS B., PUISSAUVE R., ONEMA, MNHN

Diffuseur des métadonnées : Office français de la biodiversité

Mots clés : REGLEMENTATION, ESPECE PROTEGEE, PEDAGOGIE, OISEAU, CARTE DE REPARTITION, HABITATS, CYCLE DE VIE, METHODE DE DETECTION

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, FAUNE

Date : 2015

Type de ressource : Document

Format : text/xml

Source : Espèce protégée, 4p.

Langue : Français

Droits d'utilisation : Accès libre

Niveau de lecture : Documents techniques

Accéder à la notice source : https://oai-gem.ofb.fr/exl-php/vue-consult/ofb_recherche_oai/DOC00083518

Télécharger les documents :

https://oai-gem.ofb.fr/exl-php/document-affiche/ofb_recherche_oai/OUVRE_DOC/60146?fic=PUBLI/R11/91.pdf

Emprise nationale : FXX

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/sterne-naine-sternula-albifrons-pallas-17640>

Evaluer cette notice: