

Quelle est la proportion d'ombles chevaliers (*Salvelinus alpinus* L.) issus de reproduction naturelle ou de repeuplement, dans le Léman



La proportion d'ombles chevaliers, *Salvelinus alpinus* (L.), issus de fraye naturelle, des cohortes 1984 et 1985, a été estimée en marquant une partie des estivaux issus de pisciculture immergés dans le Léman. En 1984, entre 8.3 et 24.8 % seulement des estivaux présents dans les eaux suisses, au moment de la mise à l'eau des individus marqués, étaient issus de fraye naturelle. Ce chiffre est compris entre 19.1 et 34.9 % pour la cohorte 1985. Le repeuplement apparaît donc comme très efficace. Une étude des principaux sites de fraye de l'omble, de même qu'une analyse des statistiques de pêche, démontre également cette efficacité.

Auteurs du document : J. F. RUBIN, B. BUTTIKER

Obtenir le document : EDP Sciences

Thème (issu du Text Mining) : FAUNE

Date : 2008-10-01

Format : text/xml

Source : <https://doi.org/10.1051/kmae:1993022>

Langue : Français

Télécharger les documents : <https://www.kmae-journal.org/10.1051/kmae:1993022/pdf>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/quelle-est-la-proportion-d-ombles-chevaliers-salvelinus-alpinus-l-issus-de-reproduction-naturelle-ou0>

Evaluer cette notice: