

Bilan des marquages de truites (LT > 8 cm) relâchées dans le lac d'Annecy et le Léman de 1964 à 1977



L'article présente un bilan des relâchers de truites (*Salmo trutta* et *Salmo gairdneri*) d'élevage marquées réalisés dans le lac d'Annecy et le Léman. Les recaptures par pêche, sportive et professionnelle, sont analysées en prenant en compte l'espèce, le site de relâcher, la période du relâcher, la taille et le type de marque. Trois principales tendances se dégagent : — les recaptures sont essentiellement réalisées en lac. — les recaptures déclarées augmentent avec la taille au déversement. — à taille égale (> 15 cm), les recaptures déclarées sont généralement plus fortes pour les relâchers réalisés en été et en début d'automne que pour ceux réalisés en hiver. Les résultats sont comparés aux données publiées sur l'efficacité des repeuplements de truite en lac.

Auteurs du document : D. GERDEAUX, A. CHAMPIGNEULLE, P. J. LAURENT, J. GUILLARD

Obtenir le document : EDP Sciences

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, FAUNE

Date : 2008-08-01

Format : text/xml

Source : <https://doi.org/10.1051/kmae:1990006>

Langue : Français

Télécharger les documents : <https://www.kmae-journal.org/10.1051/kmae:1990006/pdf>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/bilan-des-marquages-de-truites-lt-8-cm-relachees-dans-le-lac-d-annecy-et-le-leman-de-1964-a-19770>

Evaluer cette notice: