

Activité nycthémerale et utilisation de la séquence radier-profond par les truitelles d'un an (*Salmo trutta* L.)



Le comportement d'un groupe de dix truitelles d'un an (*Salmo trutta* L.) a été étudié au cours de deux cycles d'observation de 3 jours dans une séquence radier-profond reconstituée en milieu semi-naturel. Des changements de préférences d'habitat ont été mis en évidence à l'échelle du nycthémère et correspondent à des changements d'activité (repos, nage et alimentation). Lorsqu'elles sont en nage statique et en alimentation sur la dérive, les truitelles défendent leur poste et occupent le radier et le profond en pleine eau. Au repos, elles sont posées sur le fond du contre-courant et du profond, et elles n'exhibent pas de comportement agonistique. De plus, les truitelles ont montré un rythme d'activité diurne prononcé.

Auteurs du document : J. M. ROUSSEL, A. BARDONNET

Obtenir le document : EDP Sciences

Thème (issu du Text Mining) : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PAYSAGE

Date : 2008-08-01

Format : text/xml

Source : <https://doi.org/10.1051/kmae:1995025>

Langue : Français

Télécharger les documents : <https://www.kmae-journal.org/10.1051/kmae:1995025/pdf>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/activite-nycthemerale-et-utilisation-de-la-sequence-radier-profond-par-les-truitelles-d-un-an-salmo-0>

Evaluer cette notice: