

Premières observations sur la truite (*Salmo trutta* L.) dans le Redon, un petit affluent-frayère du lac Léman



La reproduction de la truite commune (*Salmo trutta* L.) a été suivie trois années consécutives du début novembre à la mi-janvier, dans un petit affluent du Lac Léman. Le suivi a été réalisé en utilisant deux techniques complémentaires : la pêche électrique et le comptage des frayères. L'activité de fraie des truites lacustres est comparée à celle des truites sédentaires. L'étude précise les caractéristiques des populations en place avant la fraie, ainsi que celles des géniteurs de truite de lac. Les mouvements des juvéniles sont sommairement étudiés.

Auteurs du document : A. CHAMPIGNEULLE, M. MELHAOUI, G. MAISSE, J. L. BAGLINIÈRE, C. GILLET, D. GERDEAUX, P. LAURENT, J. ESCOMEL

Obtenir le document : EDP Sciences

Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, FAUNE

Date : 2008-08-01

Format : text/xml

Source : <https://doi.org/10.1051/kmae:1988006>

Langue : Français

Télécharger les documents : <https://www.kmae-journal.org/10.1051/kmae:1988006/pdf>

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/premieres-observations-sur-la-truite-salmo-trutta-l-dans-le-redon-un-petit-affluent-frayere-du-lac-l1>

Evaluer cette notice: